

内科护理学(一)试题

课程代码:02998

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 支气管肺癌最常见的早期症状是
 - A. 发热
 - B. 刺激性干咳
 - C. 胸痛
 - D. 呼吸困难
2. 适用于痰量较多且咳嗽反射弱的昏迷患者的排痰措施是
 - A. 雾化吸入
 - B. 胸部叩击
 - C. 体位引流
 - D. 机械吸痰
3. 某患者结核菌素试验 72 小时后皮肤硬结的直径为 18mm,其结果为
 - A. 可疑阳性
 - B. 弱阳性
 - C. 阳性
 - D. 强阳性
4. 患者,男性,68 岁,因“慢性肺源性心脏病”收入院。现患者喘憋明显、略有烦躁,在治疗过程中,应慎用镇静剂以避免诱发
 - A. 洋地黄中毒
 - B. 双重感染
 - C. 低钾血症
 - D. 肺性脑病
5. 下列由于体循环淤血所致的表现是
 - A. 颈静脉怒张
 - B. 端坐呼吸
 - C. 夜间阵发性呼吸困难
 - D. 咳粉红色泡沫痰

6. 临幊上治疗慢性心力衰竭最常用的强心药物是
A. 多巴胺 B. 多巴酚丁胺
C. 氨力农 D. 地高辛
7. 静脉滴注时易见光分解、应现用现配的药物是
A. 酚妥拉明 B. 硝酸甘油
C. 硝普钠 D. 氨茶碱
8. 下列心律失常类型中，可通过刺激迷走神经终止的是
A. 房室交界性早搏 B. 室上性阵发性心动过速
C. 室性早搏 D. 室性阵发性心动过速
9. 患者，男性，73岁，因“胸骨后疼痛、伴恶心、呕吐4小时”，以“急性心肌梗死”收入院。该患者需绝对卧床的时间为发病后
A. 1~3天 B. 3~5天
C. 5~7天 D. 10~14天
10. 房颤时心脏听诊特点不包括
A. 脉率少于心率 B. 心律完全不规则
C. 第一心音强弱不等 D. 第二心音减弱
11. 对早期糖尿病肾病伴高血压者肾功能具有保护作用的降压药物是
A. 保钾利尿剂 B. β 受体阻滞剂
C. 血管紧张素转换酶抑制剂 D. 钙通道阻滞剂
12. 扩张型心肌病的死亡原因主要是
A. 顽固性心力衰竭 B. 室性心律失常
C. 脑栓塞 D. 肺部感染
13. 慢性浅表性胃炎最主要的病因是
A. 非甾体类抗炎药 B. 胆汁返流
C. 幽门螺杆菌感染 D. 酗酒
14. 患者，男性，65岁，胃溃疡病史30年。近2周感上腹部持续疼痛，服用治疗胃溃疡的药物无效，并伴有黑便多次。为明确诊断，首选的检查是
A. X线钡餐检查 B. 胃镜及活组织检查
C. 粪便隐血试验 D. 幽门螺杆菌检测
15. 进展期胃癌最早出现的症状是
A. 恶心、呕吐 B. 食欲下降
C. 呕血、黑便 D. 上腹痛

16. 我国肝硬化最主要的原因是
A. 病毒性肝炎 B. 酒精中毒
C. 血吸虫病 D. 胆汁淤积
17. 肝硬化最常见的并发症是
A. 感染 B. 肝肾综合征
C. 肝性脑病 D. 上消化道出血
18. 患者，男性，65岁，因“食管胃底静脉曲张破裂出血”入院，给予止血、补液、三腔管压迫等治疗。三腔管压迫3日后出血停止，此时宜采取的措施是
A. 立即拔出三腔管，继续观察24小时
B. 仅放出胃气囊内气体，继续观察24小时
C. 放出食管及胃气囊内气体，继续观察24小时
D. 继续观察24小时后，放气拔管
19. 少尿是指每日尿量少于
A. 100 ml B. 400 ml
C. 750 ml D. 1000 ml
20. 慢性肾小球肾炎患者应避免使用的药物是
A. 青霉素 B. 庆大霉素
C. 阿奇霉素 D. 头孢菌素
21. 肾病综合征患者最常见的症状是
A. 高血压 B. 水肿
C. 营养不良 D. 感染
22. 胰岛素增敏剂的主要不良反应是
A. 水肿 B. 低血糖
C. 腹胀 D. 粒细胞缺乏症
23. 反映甲状腺功能最敏感的指标是
A. 血清总甲状腺素(TT₄) B. 血清游离甲状腺素(FT₄)
C. 游离三碘甲状腺原氨酸(FT₃) D. 促甲状腺激素(TSH)
24. 甲状腺功能亢进患者肌肉骨骼系统的表现主要为
A. 慢性甲亢性肌病 B. 重症肌无力
C. 甲亢性周期性麻痹 D. 帕金森氏病

25. 护士应指导缺铁性贫血患者多进食

- A. 动物肝脏
- B. 牛奶
- C. 鸡蛋清
- D. 乳酪

26. 下列急性白血病化疗药物可引起心脏损害的是

- A. 长春新碱
- B. 甲氨蝶呤
- C. 阿糖胞苷
- D. 柔红霉素

27. 一氧化碳中毒昏迷患者吸氧的方法为

- A. 高浓度高流量
- B. 中等浓度中等流量
- C. 低浓度低流量
- D. 持续低流量

28. 敌百虫中毒患者洗胃禁用

- A. 清水
- B. 碳酸氢钠
- C. 高锰酸钾
- D. 生理盐水

29. 传染病的病程发展中，从患者开始感到不适至出现该病的明显症状时为止的一段时间，称为

- A. 潜伏期
- B. 前驱期
- C. 症状明显期
- D. 恢复期

30. HBeAg 阴转后出现抗-HBe 表示

- A. 病毒停止复制，无传染性
- B. 病毒复制减少，无传染性
- C. 病毒复制减少，传染性降低
- D. 病毒复制活跃，传染性强

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分）

31. 支气管扩张症及肺脓肿患者的大量痰液静置后会出现_____现象。

32. 慢性阻塞性肺疾病的病程可分为_____期和_____期。

33. 发绀是指血液中_____增多所致皮肤、粘膜呈现青紫色的现象。

34. 长期心房颤动的患者使用洋地黄后，心室节律转为规整，要注意有发生
_____的可能。

35. 恶性高血压表现为血压明显增高，舒张压可达_____mmHg 以上。
36. 肝硬化患者短期内出现肝脏迅速增大、持续性肝区疼痛、腹水呈血性，应考虑并发_____的可能。
37. 消化性溃疡在临幊上以慢性病程、_____、_____为特点。
38. 急性肾小球肾炎的治疗以_____及对症治疗为主。
39. 血小板计数低于_____ $\times 10^9/L$ 为血小板减少。
40. 过敏性紫癜是较为常见的一种血管_____性出血性疾病。
41. 作用于骨、肾，通过升高血钙和降低血磷，调节体内钙磷代谢的内分泌激素是_____。
42. 甲型肝炎易感人群主动免疫可接种_____。
43. 艾滋病患者机会性感染以_____肺炎最常见。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

44. 机械通气
45. 心绞痛
46. 风湿性疾病
47. 日射病
48. 腹膜透析

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

49. 简述急性左心衰竭患者的护理要点。
50. 简述急性胰腺炎的主要症状。
51. 简述再生障碍性贫血患者发生颅内出血时的护理措施。
52. 简述流行性乙型脑炎的预防措施。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

53. 患者，男性，18岁，2小时前于游园时突然张口喘息，大汗淋漓。查体：T 36.5°C，P 130 次/分，R 32 次/分，BP 110/70mmHg，神志清醒，表情紧张，端坐位，口唇发绀，双肺叩诊过清音，呼气相明显延长，双肺可闻及广泛哮鸣音。入院诊断“支气管哮喘（重度发作）”。医嘱予以抗炎、止喘、补液等治疗。

请写出：（1）该患者目前最主要的一个护理诊断及诊断依据。

（2）指导患者正确使用定量吸入器的方法。

54. 患者，女性，20岁，患糖尿病5年，使用胰岛素治疗。近半个月自行停用胰岛素，3天来多尿、食欲减退，恶心、呕吐，1天来神志不清。查体：昏迷状态，BP 100/60mmHg，R 28次/分，呼气中有烂苹果味，皮肤干燥，双眼球下陷，心率92次/分，肺、腹（-）。实验室检查：尿糖（++++），尿酮体强阳性，血糖26mmol/L，血pH 7.30。

请写出：（1）该患者发生的并发症及其诱因。

（2）该患者目前主要的护理措施。