

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

内科护理学(一)试题

课程代码:02998

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 慢性肺源性心脏病患者死亡的首要原因是
 - A. 心律失常
 - B. 电解质紊乱
 - C. 肺性脑病
 - D. 消化道出血
2. 医院获得性肺炎的常见致病菌是
 - A. 革兰阴性杆菌
 - B. 革兰阳性球菌
 - C. 支原体
 - D. 病毒
3. 慢性呼吸衰竭最常见的病因是
 - A. 支气管扩张症
 - B. 支气管哮喘
 - C. 肺结核
 - D. 慢性阻塞性肺疾病
4. 患者痰标本留取后送检时间不宜超过
 - A. 6 小时
 - B. 4 小时
 - C. 2 小时
 - D. 1 小时
5. 动脉血氧分压正常值范围是
 - A. 60~85cmH₂O
 - B. 85~100cmH₂O
 - C. 60~85mmHg
 - D. 85~100mmHg
6. 诊断气胸最准确、可靠的方法是
 - A. 胸部 X 线检查
 - B. 血气分析
 - C. 纤维支气管镜检查
 - D. 肺功能检查

7. 心肌的营养供应主要来自
- A. 主动脉
B. 肺动脉
C. 主动脉窦
D. 冠状动脉
8. 患者，男性，78岁，因“慢性心力衰竭”入院治疗。入院时水肿较严重，患者能够下床活动，护士在评估其水肿时，应重点评估的部位是
- A. 眼睑
B. 双下肢
C. 枕部
D. 腰骶部
9. 主要通过降低心脏后负荷来治疗心力衰竭的药物是
- A. 氯沙坦
B. 氢氯噻嗪
C. 硝酸甘油
D. 硝普钠
10. 急性肺水肿患者呼吸困难的特点是
- A. 突然出现严重的呼吸困难，有窒息感
B. 发作性呼气性呼吸困难
C. 逐渐加重的呼气性呼吸困难
D. 活动时发生或加重的轻度呼吸困难
11. 确定主动脉瓣关闭不全最敏感的检查是
- A. X线
B. 心电图
C. 超声心动图
D. 胸部CT
12. 十二指肠溃疡患者典型的疼痛节律为
- A. 饥饿—疼痛—缓解
B. 饥饿—进食—疼痛
C. 疼痛—进食—缓解
D. 进食—疼痛—缓解
13. 三腔气囊管压迫止血适用于治疗
- A. 消化性溃疡出血
B. 急性胃粘膜损害出血
C. 食管胃底静脉曲张破裂出血
D. 胃癌出血
14. 原发性肝癌非手术治疗的首选方法是
- A. 肝动脉栓塞化疗
B. 中医治疗
C. 放射治疗
D. 免疫治疗
15. 治疗急性胰腺炎禁用
- A. 哌替啶
B. 吗啡
C. 奥曲肽
D. 奥美拉唑
16. 参与正常止血过程的主要因素除血管、凝血因素外，还包括
- A. 血小板因素
B. 抗凝血因素
C. 感染因素
D. 内分泌因素

17. 可导致出血性膀胱炎的化疗药是
- A. 阿霉素
B. 羟基脲
C. 维甲酸
D. 环磷酰胺
18. 与巨幼细胞贫血发生相关的维生素是
- A. 维生素A
B. 维生素B₆
C. 维生素B₁₂
D. 维生素K
19. 缺铁性贫血患者口服铁剂时不宜
- A. 食用酸奶
B. 饮茶
C. 服用维生素C
D. 饮果汁
20. 患者，女性，38岁，因“肾病综合征”门诊治疗。患者每日尿量1200ml左右，轻度水肿，其每日水的摄入量
- A. 可不严格控制
B. 控制在1200ml以内
C. 控制在1000ml以内
D. 控制在800ml以内
21. 肾盂肾炎患者最常见的感染途径是
- A. 腹腔感染
B. 血行感染
C. 上行感染
D. 淋巴管感染
22. 淡漠型甲亢的临床特点为
- A. 高代谢症群明显
B. 常有甲状腺肿
C. 常有突眼
D. 嗜睡乏力明显
23. 患者，男性，70岁，2型糖尿病5年，目前采用格列吡嗪治疗。某日与家人登山途中，突然出现心慌、手抖伴饥饿感，静坐休息无明显好转。此时，患者应首先采取的措施是
- A. 口服降糖药
B. 含服速效救心丸
C. 含服硝酸甘油
D. 饮含糖饮料
24. 患者，女性，46岁，诊断为类风湿关节炎5年。近几天来手、足及膝关节肿胀，疼痛加重，活动后疼痛减轻，伴有食欲不振、乏力等不适，其护理措施错误的是
- A. 卧床休息
B. 平卧时小腿处放置软枕
C. 维持膝关节屈曲位
D. 维持肩关节外展位
25. 强酸中毒的发病机制是
- A. 窒息作用
B. 腐蚀作用
C. 麻醉作用
D. 酶活力受抑制
26. 患者，女性，39岁，有机磷农药中毒入院。患者双侧瞳孔缩小，呼吸困难，两肺满布湿啰音，导致上述临床表现的主要原因是
- A. 动眼神经持久兴奋
B. 副交感神经持久兴奋
C. 交感神经持久兴奋
D. 运动神经元持久兴奋

27. 流行性乙型脑炎的传染源是
- A. 鸡
B. 狗
C. 猪
D. 鼠
28. 传染病的预防措施中, 用于保护易感人群的被动免疫措施是接种
- A. 疫苗
B. 菌苗
C. 类毒素
D. 抗毒素
29. 乙肝患者抗-HBs 阳性说明
- A. 现症HBV感染
B. HBV病毒复制活跃
C. HBV病毒传染性弱
D. 乙肝恢复期
30. 狂犬病特有的临床表现是
- A. 黄视
B. 恐水
C. 恐光
D. 肌肉痉挛

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

二、填空题 (本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分)

31. 肺梗死三联征包括呼吸困难、_____和咯血。
32. 慢性支气管炎的诊断标准是: 每年咳嗽、咳痰(或伴喘息)至少_____个月, 并连续 2 年或更长; 能除外其他原因引起的慢性咳嗽。
33. 75%~80%的心脏骤停患者是由_____所致。
34. 肝性脑病可根据意识障碍程度、神经系统表现和_____改变分为四期。
35. 血液由血细胞和_____组成。
36. 内分泌系统的反馈调节存在于下丘脑、_____与靶腺之间, 主要是_____反馈调节。
37. 1 型糖尿病主要是以遗传性易感人群为背景的、由病毒感染所致的胰岛 B 细胞自身免疫反应引起的 B 细胞破坏和功能损害, 导致_____分泌绝对不足。
38. 风湿性疾病关节病变除有疼痛外, 还伴有_____和_____障碍。
39. 系统性红斑狼疮最具特征性的皮疹为双面颊和_____部位呈蝶形红斑。
40. 大多数毒物由_____和_____排出。

41. 霍乱典型病例的病程分泻吐期、_____期和反应（恢复）期。
42. 人类免疫缺陷病毒（HIV）存在于感染者的_____及各种体液中。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

43. 支气管扩张症
44. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
45. 溃疡性结肠炎
46. 类风湿关节炎
47. 传染源

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

48. 简述肺炎患者的护理要点。
49. 列出肝硬化患者的常见并发症（至少 5 个）。
50. 简述各型弥散性血管内凝血临床表现的共同特点。
51. 简述糖尿病患者进行体育锻炼的要求。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

52. 患者，男性，52 岁，近半年来常于劳累后感乏力伴呼吸困难，休息后好转，外院诊断为“心律失常，二度 II 型房室传导阻滞”。1 天前患者于超市购物时突发晕厥，伴抽搐，来院急诊。查体：BP 85/55mmHg，HR 30 次/分，律不齐，以“晕厥待查”收入院。入院后，完善各项检查，给予置入人工心脏起搏器治疗。

请写出：（1）该患者发生晕厥的主要原因；

（2）置入起搏器术后健康教育的内容。

53. 患者，女性，65 岁，因“发现血肌酐进行性升高 3 年，双下肢水肿 2 周”收入院。发病以来，自觉乏力伴恶心、食欲下降，皮肤瘙痒。既往高血压 20 年。入院查体：T 36.4℃，P 80 次/分，R 20 次/分，BP 145/90mmHg，贫血貌，前臂可见抓痕，双下肢中度水肿。实验室检查：血红蛋白 79g/L，尿蛋白++，24 小时尿蛋白定量 1.5g/d，尿素氮 25mmol/L，血肌酐 489 μmol/L，钙 2.12 mmol/L，磷 2.20 mmol/L，钾 5.6 mmol/L。初步诊断为慢性肾功能衰竭。

请写出：（1）该患者诊断为肾功能衰竭的主要依据；

（2）患者皮肤瘙痒的原因；

（3）患者水肿的主要护理措施。