

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试

内科护理学(一) 试题

课程代码:02998

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急性呼吸窘迫综合征最早、最客观的临床表现是

- A. 急性进行性呼吸窘迫和呼吸频数
- B. 顽固性低氧血症
- C. 神志淡漠伴发绀
- D. 肺部闻及干性或湿性啰音

2. 患者,男性,35 岁,下叶后基底段支气管扩张。该患者正确的体位引流姿势是

- A. 头高脚低,仰卧位
- B. 头高脚低,俯卧位
- C. 头低脚高,仰卧位
- D. 头低脚高,俯卧位

3. 中度呼吸困难是指

- A. 洗脸、穿衣时引起的呼吸困难
- B. 轻度体力活动引起的呼吸困难
- C. 中度体力活动引起的呼吸困难
- D. 重度及以上体力活动引起的呼吸困难

4. 继发性气胸最常见的基础肺疾病是

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. COPD
- D. 支气管哮喘

5. 二尖瓣关闭不全最常见的病因是

- A. 扩张型心肌病
- B. 肥厚型心肌病
- C. 风心病
- D. 高血压

6. 稳定型心绞痛与不稳定型心绞痛在病因和临床表现上的相似之处为
- A. 胸痛的部位
  - B. 胸痛的严重程度
  - C. 胸痛持续的时间
  - D. 粥样斑块的稳定性
7. 患者，男性，63岁，发现糖尿病10余年，糖尿病肾病1年。近日门诊测量血压为155/95mmHg。该患者降压治疗应首选具有保护肾功能作用的
- A. 氢氯噻嗪
  - B. 美托洛尔
  - C. 氨氯地平
  - D. 卡托普利
8. 患者，男性，28岁，体检发现梗阻性肥厚型心肌病。为减少猝死的发生，护士应向患者重点强调平日注意避免
- A. 呼吸道感染
  - B. 吸烟
  - C. 过量饮酒
  - D. 剧烈运动
9. 房颤伴有较快心室率时，为减慢心室率可用
- A. 阿托品
  - B. 洋地黄
  - C. 异丙肾上腺素
  - D. 利多卡因
10. 腹泻伴里急后重多见于
- A. 十二指肠病变
  - B. 空肠病变
  - C. 回肠病变
  - D. 结肠直肠病变
11. 通常不演变为肝硬化的病毒性肝炎类型为
- A. 甲型
  - B. 乙型
  - C. 丙型
  - D. 丁型
12. 肝性脑病患者表现为意识错乱、睡眠障碍和行为失常，提示处于
- A. 前驱期
  - B. 昏迷前期
  - C. 昏睡期
  - D. 昏迷期
13. 不符合急性胰腺炎腹痛特点的是
- A. 刀割痛或绞痛
  - B. 向腰背部呈带状放射
  - C. 位于中上腹偏左
  - D. 呕吐后疼痛可缓解
14. 红细胞进入血液循环后的寿命约为
- A. 6~7小时
  - B. 8~11天
  - C. 20天
  - D. 120天
15. 我国最常见的贫血类型是
- A. 缺铁性贫血
  - B. 巨幼红细胞性贫血
  - C. 溶血性贫血
  - D. 再生障碍性贫血

16. 多数淋巴瘤患者的首要表现是
- A. 发热  
B. 肝区疼痛  
C. 淋巴结肿大  
D. 脾肿大
17. DIC 最早最常见的症状是
- A. 出血  
B. 发热  
C. 贫血  
D. 微血管病性溶血
18. 女性容易感染肾盂肾炎的主要原因是
- A. 尿路梗阻  
B. 机体抵抗力降低  
C. 尿道短、直而宽  
D. 泌尿系统防御机制破坏
19. 慢性肾炎必有表现是
- A. 高血压  
B. 蛋白尿  
C. 血尿  
D. 水肿
20. 治疗慢性肾功能衰竭患者贫血的特效药物是
- A. 铁剂  
B. 叶酸  
C. 促红细胞生成素  
D. 维生素 B<sub>12</sub>
21. 患者，男性，38 岁，因“血尿伴双下肢水肿，血肌酐升高 2 月余”，诊断为慢性肾小球肾炎。该患者护理措施正确的是
- A. 鼓励患者多饮水，保持每日尿量大于 2000ml  
B. 嘱患者卧床休息时抬高下肢，增加静脉回流  
C. 给予患者正常量蛋白饮食  
D. 观察水肿消长情况，每周测量体重 1 次
22. 属于肾上腺髓质分泌的激素是
- A. 皮质醇  
B. 醛固酮  
C. 性激素  
D. 肾上腺素
23. Graves 病患者甲状腺的特点是
- A. 质地较硬且有压痛，可触及震颤  
B. 质地偏软且有压痛，无震颤  
C. 弥漫性对称性肿大且无压痛，可触及震颤  
D. 结节性非对称性肿大且无压痛，无震颤
24. 患者，女性，37 岁，诊断为甲状腺功能亢进症，医嘱给予甲硫咪唑 30mg/d 治疗。2 周后，患者出现发热、咽痛，体温 38.9℃。对于患者目前的病情变化，应首先考虑的是
- A. 甲亢病情控制不佳  
B. 甲亢危象  
C. 甲状腺毒症  
D. 粒细胞缺乏症

25. 患者，女性，48岁，确诊类风湿关节炎6年，近来因劳累关节症状加重入院。护士嘱其卧床休息，并在其双臂间置枕头，目的是维持肩关节的
- A. 内收位  
B. 外展位  
C. 内旋位  
D. 外旋位
26. 瞳孔缩小见于
- A. 阿托品中毒  
B. 甲醇中毒  
C. 有机磷农药中毒  
D. 一氧化碳中毒
27. 构成传染病流行的基本条件是
- A. 微生物、宿主、媒介  
B. 传染源、传播途径、易感人群  
C. 病原体、环境、宿主  
D. 病原体数量、毒力、侵袭力
28. 患者，女性，38岁，患慢性乙型肝炎10年。实验室检查：HBsAg(+), HBeAg(+), 抗-HBc IgG(+). 其丈夫体检时血清抗 HBs(+), 追问病史，无明显临床症状，未注射乙肝疫苗。该患者丈夫 HBV 的感染过程属于
- A. 隐性感染  
B. 潜伏性感染  
C. 显性感染  
D. 病毒携带状态
29. 细菌性痢疾患者腹泻的特点为
- A. 粘液脓血便，量不多，有里急后重感  
B. 腹泻与便秘交替，伴腹胀  
C. 柏油样稀便，伴腹痛  
D. 米泔水样，无腹痛及里急后重感
30. 患者，男性，26岁，“发热伴食欲减退、虚弱10天，发现皮疹2天”入院，经血培养确诊为伤寒。针对该患者病原治疗首选的药物是
- A. 水杨酸类  
B. 头孢菌素类  
C. 糖皮质激素类  
D. 喹诺酮类

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 用于判断 COPD 患者是否存在气流受限的主要检查是\_\_\_\_\_。
32. 能分泌表面活性物质的肺泡上皮细胞是\_\_\_\_\_型细胞。
33. 给予急性左心衰患者高流量经酒精湿化的氧气时，吸入时间不宜过长，以免发生\_\_\_\_\_。
34. 患者自觉心跳或心慌伴心前区不适感称为\_\_\_\_\_。
35. 各种原因引起心脏冲动起源或\_\_\_\_\_的异常均能使心脏活动的规律发生紊乱，称为心律失常。
36. 上消化道出血患者急诊内镜检查通常在出血后 24h 至\_\_\_\_\_h 内进行。
37. 正常人体参与止血过程的主要因素为血管、血小板及\_\_\_\_\_因素。
38. 肾脏疾病最常见的症状是\_\_\_\_\_。
39. 人体内分泌系统直接由\_\_\_\_\_调控。
40. 类风湿关节炎主要表现为周围\_\_\_\_\_性的多关节慢性炎症病变。
41. 系统性红斑狼疮的主要病理改变为\_\_\_\_\_和血管异常。
42. 引起中毒的化学物质称\_\_\_\_\_。
43. 一氧化碳中毒时患者口唇呈\_\_\_\_\_色。
44. 流行性脑脊髓膜炎是由脑膜炎奈瑟菌引起的\_\_\_\_\_性脑膜炎，经\_\_\_\_\_传播。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

45. 结核病
46. 溃疡性结肠炎
47. 风湿性疾病
48. 中毒
49. 母婴传播

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

50. 简述食管胃底静脉曲张破裂大出血的止血措施。
51. 简述缺铁性贫血患者使用铁剂时的药物护理措施。
52. 简述急性肾功能衰竭少尿期的治疗要点。
53. 简述糖尿病患者运动治疗（体育锻炼）的益处。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

54. 患者，男性，75 岁，慢性咳嗽、咳痰 20 余年，确诊 COPD 5 年。1 周前着凉后出现咳嗽、咳白色粘液痰，自服感冒药物未见好转。近 3 天患者自觉疲乏、无力，咳嗽、咳痰加重。半天前，患者自觉明显喘憋，呼吸费力并伴头痛、大汗，家属送急诊。急查动脉血气示：PH 7.39，PaO<sub>2</sub> 50mmHg，PaCO<sub>2</sub> 60mmHg，SaO<sub>2</sub> 88%，以“COPD，慢性呼吸衰竭急性加重”收入院。查体：T 38.8℃，P 82 次/分，R 24 次/分，BP 115/70mmHg，神志清楚，口唇发绀，听诊双肺呼吸音减弱，呼气延长，肺底可闻及散在干、湿啰音，HR 82 次/分，律齐，各瓣膜听诊区未闻及杂音，余（-）。

请写出：（1）该患者诊断为慢性呼吸衰竭的主要依据及急性加重的诱因。

（2）该患者氧疗的方式和目标值。

（3）该患者病情观察的要点。

55. 患者，男性，49 岁，5 年前体检发现血压 175/105mmHg，此后间断服用降压药物治疗，具体控制情况不详。3 小时前，患者因连续熬夜工作突感剧烈头痛，视力模糊，伴呕吐，呈喷射样。急诊以“高血压急症”收入院。既往吸烟 20 余年，每日约 1.5 包，少量饮酒。入院后测 T 36.8℃，P 88 次/分，R 20 次/分，BP 195/120mmHg，身高 172cm，体重 95kg。查血糖、血脂、肝肾功能均正常，医嘱予硝普钠每分钟 15μg 泵入，持续吸氧。

请写出：（1）静脉应用硝普钠的护理要点。

（2）该患者出院前的健康教育内容。