

绝密 ★ 考试结束前

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试  
内科护理学(一) 试题  
课程代码:02998

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 急性气管-支气管炎最主要的病因是

- A. 理化因素  
B. 过度劳累  
C. 感染  
D. 过敏反应

2. I 型呼吸衰竭的血气分析特点是

- A.  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2$  降低或正常  
B.  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$   
C.  $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$   
D.  $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ ,  $\text{PaCO}_2$  降低或正常

3. 确诊肺结核最特异的检查方法是

- A. 血常规  
B. 结核菌素试验  
C. 痰菌检查  
D. 影像学检查

4. “干性支气管扩张”患者的临床特征为

- A. 慢性咳嗽、咳脓痰  
B. 反复发生肺部感染  
C. 以反复咯血为唯一症状  
D. 反复胸痛

5. 患者，男性，29岁，诊断为支气管哮喘。该患者药物治疗中，能预防变应原引起的速发和迟发性反应的是
- A. 糖皮质激素  
B. 白三烯受体拮抗剂  
C. 氨茶碱  
D. 色甘酸钠
6. 肺心病死亡的首要原因是
- A. 呼吸性酸中毒  
B. 休克  
C. 消化道出血  
D. 肺性脑病
7. 彻底治疗扩张型心肌病的方法是
- A. 治疗心力衰竭  
B. 治疗心律失常  
C. 室间隔肥厚心肌切除术  
D. 心脏移植术
8. 二尖瓣狭窄最常见的早期症状是
- A. 呼吸困难  
B. 腹胀  
C. 咯血  
D. 水肿
9. 患者，女性，68岁，诊断慢性心力衰竭3年。目前患者生活能够自理，日常活动后无心悸、呼吸困难等不适症状。根据美国 NYHA 心功能分级标准，其心功能分级属于
- A. I级  
B. II级  
C. III级  
D. IV级
10. 导致心脏骤停的直接原因最常见的是
- A. 心房颤动  
B. III度房室传导阻滞  
C. 心室颤动  
D. 阵发性室性心动过速
11. 患者，女性，51岁。既往体健，两年前体检发现血压增高，为高血压二级，开始规律服用降压药物治疗。护士应告知该患者降压治疗的目标血压值应低于
- A. 150/90mmHg  
B. 140/90mmHg  
C. 130/80mmHg  
D. 120/80mmHg
12. 溃疡性结肠炎患者出现鼓肠、腹部压痛、肠鸣音消失，X线腹部平片见结肠扩大，提示出现
- A. 肠出血  
B. 肠梗阻  
C. 肠穿孔  
D. 中毒性巨结肠
13. 中晚期肝癌最常见的体征是
- A. 低热  
B. 全腹压痛  
C. 肝肿大  
D. 黄疸

14. 患者，男性，45岁，因肝性脑病收入院，遵医嘱予以灌肠。该患者不宜选用的灌肠液是
- A. 生理盐水      B. 食醋      C. 肥皂水      D. 乳果糖
15. 我国急性胰腺炎最常见的病因是
- A. 胆道疾病      B. 胰管阻塞  
C. 酗酒      D. 暴饮暴食
16. 为判断消化道出血患者的出血部位及出血情况，急诊行胃镜检查的时间通常在出血后
- A. 4~6小时      B. 24~48小时  
C. 48~72小时      D. 3~5天
17. 患者，男性，45岁，诊断为慢性粒细胞白血病。该患者化疗首选的药物是
- A. 羟基脲      B. 白消安  
C. 靛玉红      D. 柔红霉素
18. 淋巴瘤患者最常见的首要表现是
- A. 持续性高热      B. 淋巴结肿大  
C. 皮肤瘙痒      D. 肝区疼痛
19. 患者，男性，45岁，门诊血常规示Hb 69g/L。其贫血程度为
- A. 轻度      B. 中度  
C. 重度      D. 极重度
20. 糖尿病患者饮食中，碳水化合物供能约占总热量的比例为
- A. 20%~30%      B. 30%~40%  
C. 40%~50%      D. 50%~60%
21. 符合糖尿病视网膜病变早期的表现是
- A. 视网膜出血、渗出      B. 新生血管形成  
C. 机化物增生      D. 视网膜剥离
22. 皮质醇增多症的典型临床表现不包括
- A. 满月脸      B. 低血压  
C. 多血质      D. 骨质疏松

23. 患者，女性，30岁，孕23周，诊断为甲状腺功能亢进症。该患者禁用
- A. 手术治疗
  - B. 复方碘口服溶液治疗
  - C. 抗甲状腺药物治疗
  - D. 放射碘治疗
24. 类风湿关节炎患者关节疼痛的特点是
- A. 久站、走路后加剧，休息后缓解
  - B. 多影响腕、掌指、近端指间关节
  - C. 剧烈疼痛，呈对称性分布
  - D. 多累及负重的髌、膝关节
25. 为减轻一氧化碳中毒昏迷患者脑组织缺氧，给予吸氧的氧流量为
- A. 2~4L/min
  - B. 4~6L/min
  - C. 6~8L/min
  - D. 8~10L/min
26. 对人体有窒息作用的毒物是
- A. 硫化氢
  - B. 甲醇
  - C. 吸入性麻醉药
  - D. 汞
27. 丙型肝炎的主要传播途径是
- A. 粪口传播
  - B. 血液传播
  - C. 性接触传播
  - D. 日常生活接触传播
28. 患者，女性，45岁，诊断为伤寒。该患者需严格卧床休息至热退后
- A. 2天
  - B. 3天
  - C. 5天
  - D. 7天
29. 普通型流行性脑脊髓膜炎败血症期的主要表现是
- A. 咽痛、咳嗽、鼻炎
  - B. 寒战、高热、瘀点或瘀斑
  - C. 意识障碍、烦躁
  - D. 剧烈头痛、频繁呕吐
30. 治疗霍乱的关键是
- A. 病原治疗
  - B. 严密隔离
  - C. 补液疗法
  - D. 并发症治疗

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 肺血栓栓塞症以肺循环和\_\_\_\_\_功能障碍为主要病理生理特点和临床表现特征。
32. 防治哮喘最有效的方法是\_\_\_\_\_。
33. 动脉血气分析检查中酸碱度（pH）的正常范围为\_\_\_\_\_。
34. 排菌的肺结核患者应予以\_\_\_\_\_隔离。
35. 诊断心绞痛最常用的方法是\_\_\_\_\_。
36. 补充有效循环血容量是治疗休克的根本措施，补液量一般应根据\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_水平确定，还应注意尿量、尿比重。
37. 上消化道出血的特征性表现是呕血和\_\_\_\_\_。
38. 目前认为慢性浅表性胃炎最主要的病因是\_\_\_\_\_。
39. 肝性脑病可根据意识障碍程度、神经系统表现和\_\_\_\_\_改变分为四期。
40. 出生后人体的主要造血器官是\_\_\_\_\_。
41. 内分泌系统存在反馈调节现象，如血糖升高可刺激胰岛 B 细胞分泌\_\_\_\_\_。
42. 系统性红斑狼疮的主要病理改变为\_\_\_\_\_反应和血管异常。
43. 阿托品治疗有机磷急性中毒的原则是\_\_\_\_\_、足量、反复给药。
44. 传染源包括患者、隐性感染者、\_\_\_\_\_和受感染的动物。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

45. 机械通气
46. 肝硬化
47. 糖尿病
48. 特发性血小板减少性紫癜
49. 中暑

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

50. 简述急性上呼吸道感染患者健康教育的内容。
51. 简述消化性溃疡患者饮食护理要点。
52. 简述类风湿关节炎患者急性期活动与休息的护理要点。
53. 简述预防艾滋病切断传播途径的主要措施。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

54. 患者，男性，56 岁。8 小时前无明显诱因出现心前区剧烈压榨样疼痛，并向左肩及左上肢内侧放射，伴大汗、恶心，连续含服硝酸甘油 5 次后疼痛仍无改善，急诊入院。查 ECG 示：V<sub>1</sub>~V<sub>5</sub> 导联 ST 段抬高，以急性前壁心肌梗死收入 CCU，拟行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。查体：T 36.8℃，R 16 次/分，P 72 次/分，BP 115/70mmHg，双肺呼吸音清，HR 72 次/分，律齐，听诊心音低钝，余 (-)。

请写出：(1) 该患者诊断为急性心肌梗死的主要依据。

(2) 为进一步明确诊断，尚需进行的有关检查项目。

(3) 该患者目前最主要的 1 个护理诊断/问题及护理措施。

55. 患者，男性，28 岁。主因“头痛、头晕 2 个月，加重 3 天”入院。患者 2 月前自觉头痛、头晕、食欲不振，伴轻度的双下肢浮肿和夜尿增多，未予诊治。3 天前连续加班熬夜后上述症状明显加重。急诊查体：T 36.5℃，P 72 次/分，R 18 次/分，BP 180/100mmHg，贫血貌，双肺呼吸音清，HR 72 次/分，律齐，双下肢轻度凹陷性水肿，余 (-)。实验室检查：Hb 78g/L，尿蛋白 (+++)，尿潜血 (+++)，血尿素氮 26.2mmol/L，血清肌酐 633 μmol/L，血清肌酐清除率 15ml/min。B 超示双肾体积缩小，肾实质损害。初步诊断为慢性肾功能衰竭，为进一步诊治入院。

请写出：(1) 该患者降压治疗首选的药物类别。

(2) 导致该患者贫血的主要原因。

(3) 该患者目前主要的护理措施。