

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

妇产科护理学(一)试题

课程代码:03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 导致自然流产最主要的原因是
A. 母儿血型不合
B. 染色体异常
C. 内分泌失调
D. 子宫畸形
2. 关于月经,下列描述错误的是
A. 月经第一次来潮称为初潮
B. 月经周期一般为 28~30 天
C. 每次月经持续时间称经期
D. 月经量超过 50ml 表明量过多
3. 某女,会阴切开缝合术拆线 1 天后伤口裂开,创面新鲜,此时应采取的措施是
A. 立即缝合
B. 冲洗外阴阴道
C. 95%酒精湿热敷
D. 50%硫酸镁湿热敷
4. 某女,28 岁,痛经 10 年、呈渐进性加重,原发不孕,首先考虑的疾病是
A. 子宫颈炎
B. 输卵管炎
C. 子宫内膜异位症
D. 多囊卵巢综合征
5. 由于体重下降导致的闭经属于
A. 子宫性闭经
B. 卵巢性闭经
C. 垂体性闭经
D. 下丘脑性闭经
6. 足月新生儿生理性黄疸高峰出现的时间,为出生后
A. 2~3 天
B. 4~5 天
C. 7~8 天
D. 9~10 天

7. 产后 3 天正常恶露的特点是
- A. 白色, 无味
B. 白色, 有臭味
C. 有血腥味, 无臭味
D. 有血腥味, 有臭味
8. 某孕妇, 平素月经规律, 周期正常, 末次月经为 2015 年 3 月 9 日, 推测其预产期为
- A. 2015 年 12 月 16 日
B. 2015 年 12 月 23 日
C. 2016 年 1 月 16 日
D. 2016 年 1 月 23 日
9. 正常产妇, 新生儿人工喂养, 其月经恢复的时间约为产后
- A. 3~5 周
B. 6~10 周
C. 3~5 个月
D. 6~10 个月
10. 某女, 结婚后有正常性生活未避孕, 未孕 2 年, 准备进行卵巢功能检查, 首先考虑进行的检查项目是
- A. 基础体温测定
B. 腹腔镜检查
C. 宫腔镜检查
D. 性交后试验
11. 阴道分泌物增多, 呈稀薄脓性、黄绿色、泡沫状, 有臭味, 常见于
- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
B. 子宫颈炎
C. 滴虫性阴道炎
D. 外阴炎
12. 妇科恶性肿瘤患者肺转移进行化疗时, 最佳的给药方式是
- A. 静脉给药
B. 肌肉注射
C. 腔内注射
D. 瘤内注射
13. 某女, 妊娠合并急性病毒性肝炎, 分娩期首先要预防的并发症是
- A. 出血
B. 感染
C. 心衰
D. 过敏性休克
14. 关于正常分娩时子宫收缩的特点, 下列描述正确的是
- A. 始终保持同一节律
B. 以子宫下段收缩最强
C. 具有缩复作用
D. 可由孕妇主动发动
15. 某女, 宫内孕 38 周, 孕 1 产 0, 产程进展中出现强直性子宫收缩, 持续腹痛, 产妇烦躁不安, 此时应给予
- A. 吗啡 1mg 皮下注射
B. 安定 10mg 静脉注射
C. 哌替啶 100mg 肌内注射
D. 25%硫酸镁 20ml+5%葡萄糖 20ml 静脉推注
16. 关于妊娠期 50g 葡萄糖筛查试验, 下列描述正确的是
- A. 所有妊娠妇女均需做筛查试验
B. 筛查时间在妊娠 24~28 周
C. 服糖后 3 小时测定血糖值
D. 血糖值 $\leq 8.6\text{mmol/L}$ 为正常

17. 产妇在第一产程中若出现尿潴留，可能导致
- A. 子宫破裂
B. 胎盘早剥
C. 产程延长
D. 胎膜破裂
18. 关于妇科手术术后护理，下列描述正确的是
- A. 术后3日盆腔内出血的最常见原因是术中结扎血管的丝线脱落
B. 硬膜外麻醉患者术后返回病房应去枕平卧12小时
C. 腹部切口张力缝合线一般于术后5~7天拆线
D. 手术后伤口疼痛通常持续24~48小时
19. 关于妇科化疗中造血系统反应的护理，下列描述正确的是
- A. 血小板低于 $30 \times 10^9 / L$ 即有潜在出血的可能
B. 白细胞计数低于 $1.0 \times 10^9 / L$ 时应考虑停药
C. 白细胞减少者应每周洗澡一次以防感染
D. 医护人员执行介入性操作时要严格无菌
20. 关于人工终止妊娠的方法，下列描述正确的是
- A. 药物流产一般适用于妊娠27周内
B. 手术流产一般适用于妊娠14周内
C. 吸宫术后患者24小时内绝对卧床休息
D. 人工终止妊娠可以直接作为避孕的方法
21. 阴道脱落细胞检查中，阴道涂片的主要目的是了解
- A. 宫颈管分泌物性质
B. 阴道上皮癌变情况
C. 阴道炎种类
D. 卵巢功能
22. 葡萄胎诊断一经成立，应即刻选择的处理是
- A. 化疗
B. 放疗
C. 清除宫腔内容物
D. 子宫切除
23. 发现宫颈癌前期病变和早期宫颈癌的主要方法是
- A. 子宫颈刮片细胞学检查
B. 阴道镜检查
C. 诊断性刮宫
D. 碘试验
24. 关于前庭大腺炎的临床表现，下列描述错误的是
- A. 炎症多发生于双侧
B. 局部肿胀、疼痛、灼热感
C. 脓肿形成后可触及波动感
D. 检查见局部皮肤红肿、发热、压痛明显
25. 引起产后出血的主要原因是
- A. 胎盘滞留
B. 宫缩乏力
C. 软产道损伤
D. 凝血功能障碍

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分)

26. 化疗药物导致的口腔溃疡, 一般停药_____天左右逐渐愈合。
27. 宫外孕手术的患者应禁止性生活_____个月。
28. 影响受孕的因素中, 女方因素以排卵障碍和_____因素居多。
29. 侵蚀性葡萄胎基本继发于_____, 而绒毛膜癌则可以继发于正常或非正常妊娠。
30. 阴道上皮在卵巢分泌的_____激素作用下, 增生变厚, 可增强抵抗病原体侵入的能力。
31. 放置产钳时, 根据胎头在盆腔内位置的高低分为_____产钳、中位产钳、高位产钳和后出头产钳。
32. 胎儿窘迫最明显的临床征象是_____异常。
33. 妊娠合并心脏病的妇女, 第二产程后应在腹部放置_____, 以减少回心血量, 避免心衰的发生。
34. 新生儿出生后, 全身皮肤覆盖一层胎脂, 具有保护皮肤和_____的作用。
35. 临产是指有规律性子宫收缩, 并逐渐加强, 同时伴有进行性宫颈口逐渐扩张和_____下降。
36. 晚期产后出血的妇女, 若有从阴道排出的组织物应保留并送_____检查。
37. 三合诊是指腹部、_____和直肠联合进行检查的方法。
38. 自月经第一日起至_____第一日的时间间隔称为月经周期。
39. 化疗的基本原则是尽量消除肿瘤细胞而减少对_____细胞的损害。
40. 经腹行全子宫切除术患者自手术日起休息_____周。

三、名词解释题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. 诊断性刮宫
42. 滋养细胞疾病
43. 盆腔炎
44. 产褥期
45. 胎方位

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

46. 简述经腹输卵管绝育术后常见并发症。
47. 简述卵巢功能减退引起的泌尿系统及外阴阴道症状。
48. 简述产褥感染妇女的护理措施。
49. 简述治疗妊娠高血压疾病时硫酸镁的使用方法和注意事项。
50. 简述正常分娩后检查胎盘胎膜的方法。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

51. 某女，35 岁，因经量增多、经期延长 2 年，症状加重 6 个月入院。患者 2 年前开始出现月经量增多，近 6 个月经期延长、量多，伴血块，无痛经，常感头晕、乏力、心悸。体检发现子宫如妊娠 3 个月大小，宫体表面呈结节感、质硬、宫体活动度好，无明显压痛，双附件无异常。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者的医疗诊断（2 分）；
- (2) 该类患者的护理措施（8 分）。

52. 某女，既往体健。现孕 36 周，孕期平顺，平卧休息 1 小时起床后，突然出现眩晕、心悸、面色苍白、出冷汗等症状。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该孕妇最可能的问题（2 分）；
- (2) 该问题产生的原因（4 分）；
- (3) 针对该问题的健康指导内容（4 分）。