

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(一) 试题  
课程代码:03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 阴道分娩过程中,胎头仰伸时的骨盆支点部位是  
A. 骶骨  
B. 坐骨结节  
C. 耻骨弓  
D. 坐骨棘
2. 妊娠合并糖尿病妇女在预产期前应结束分娩以避免过期妊娠,主要是为了防止发生  
A. 羊水过多  
B. 胎膜破裂  
C. 胎盘早剥  
D. 胎死宫内
3. 某初产妇,宫口开大 5cm 时出现继发性宫缩乏力,产科检查:无头盆不称,枕左前位,胎心 140 次/分,胎膜已破。此时最佳的处理方法是  
A. 镇静休息  
B. 加强宫缩  
C. 继续待产  
D. 立即剖宫产
4. 从对分娩的影响考虑,中骨盆最重要的径线是  
A. 对角径  
B. 后矢状径  
C. 坐骨棘间径  
D. 坐骨结节间径
5. 正常胎位是指  
A. 枕前位  
B. 骶前位  
C. 枕后位  
D. 骶后位



15. 关于妇科手术后的护理措施, 下列描述正确的是
- A. 子宫脱垂患者术后 2 年内避免重体力劳动
  - B. 一般患者麻醉清醒后腹胀即可缓解, 无需特殊处理
  - C. 术后需胃肠减压时, 可嘱患者禁食水并加强口腔护理
  - D. 术后患者每 4 小时通胃管 1 次, 以保持胃肠持续减压
16. 下列属于无排卵性功血临床表现的是
- A. 子宫明显增大
  - B. 基础体温呈单相型
  - C. 常发生于育龄期妇女
  - D. 出血期多伴有明显的腹痛
17. 正常产褥期, 非胎盘附着面的子宫内膜基本完成修复大约需要
- A. 2 周
  - B. 3 周
  - C. 4 周
  - D. 5 周
18. 骨盆外测量中的出口横径是指
- A. 髂嵴间径
  - B. 髂棘间径
  - C. 坐骨棘间径
  - D. 坐骨结节间径
19. 闭经患者进行药物撤退试验的目的是评估
- A. 垂体促性腺激素释放激素水平
  - B. 子宫内膜对激素的反应水平
  - C. 垂体促性腺激素水平
  - D. 雌激素水平
20. 关于新生儿适宜的居住条件, 下列描述错误的是
- A. 房间应阳光充足
  - B. 室温为 28℃ 左右
  - C. 相对湿度维持在 55%~60%
  - D. 日常清洁应采用湿法
21. 胚胎或胎儿已死亡滞留于宫内尚未排出, 称为
- A. 完全流产
  - B. 难免流产
  - C. 不全流产
  - D. 稽留流产
22. 关于硫酸镁肌内注射的注意事项, 下列描述错误的是
- A. 浅部肌内注射, 以减轻注射时引起的疼痛
  - B. 注意正确选择注射部位, 以免伤及坐骨神经
  - C. 出现红、肿、痛等局部反应时可用热水袋敷患处
  - D. 注射时应将 1%~2% 普鲁卡因加入硫酸镁中, 以减轻疼痛
23. 下列不孕症病因中, 属于子宫因素的是
- A. 下丘脑-垂体-卵巢轴功能紊乱
  - B. 内膜结核
  - C. 精神紧张
  - D. 阴道闭锁



39. 胎儿窘迫常表现为胎心异常和\_\_\_\_\_异常两种类型。
40. 新生儿生理性黄疸的出现，是由于出生后体内过剩的红细胞迅速破坏而产生大量的\_\_\_\_\_，新生儿肝脏酶系统不完善，不能在短期内使其排除的缘故。

**三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。**

41. 绝育
42. 输卵管通液术
43. 滋养细胞疾病
44. 见红
45. 子宫下段

**四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。**

46. 简述妇科手术后减轻腹胀的护理措施。
47. 简述女性生殖器的自然防御功能。
48. 简述协助正常分娩产妇产后排尿的方法。
49. 简述无负荷试验（NST）。
50. 简述月经周期及月经血的特点。

**五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。**

51. 某女，36 岁，因经量增多、经期延长 2 年，症状加重 6 个月入院。体检发现子宫前位，如妊娠 3 个月大小，宫体呈结节感、质硬、活动度好，无明显压痛。辅助检查：血红蛋白 80g/L。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者最可能的医疗诊断。
- (2) 该类患者的护理措施。

52. 某初产妇，30 岁，儿时患先天性心脏病曾行手术治疗。现妊娠 36 周，产前检查无异常，仍在继续工作。上班忙碌时偶有心悸的症状，休息后可好转。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该孕妇首选的分娩方式。
- (2) 该类孕妇妊娠期的护理措施。