

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(一)试题
课程代码:03002

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在妇科肿瘤化疗过程中,受影响较小的血液成分是
 - 白细胞
 - 淋巴细胞
 - 血小板
 - 红细胞
2. 吸宫术的禁忌证不包括
 - 生殖器炎症
 - 慢性肝炎急性发作
 - 妊娠剧吐伴酸中毒已纠正
 - 术前 2 次体温超过 37.5℃
3. 用来观察阴道及宫颈情况的检查方法是
 - 双合诊检查
 - 三合诊检查
 - 阴道窥器检查
 - 阴道脱落细胞检查
4. 放置宫内节育器的禁忌证不包括
 - 月经不调
 - 子宫畸形
 - 月经量过多
 - 精神病生活不能自理
5. 某女,即将接受妇科手术,护士指导其进行术后活动练习,其中不包括
 - 咳嗽
 - 深呼吸
 - 头部活动
 - 肢体活动
6. 妇科肿瘤患者出现癌性胸腹水,全身化疗效果不明显时,宜采用的化疗给药方式是
 - 腔内给药
 - 瘤内注射
 - 肌内注射
 - 动脉插管给药

7. 对无排卵性功血的描述，正确的是
- A. 出血期多伴有明显的腹痛
 - B. 基础体温呈双相型
 - C. 月经周期基本正常
 - D. 常见于围绝经期
8. 为不孕症患者进行输卵管通畅试验的时间，一般安排在
- A. 月经干净后 3~7 天
 - B. 月经来潮后 3~7 天
 - C. 性交后 3~7 小时
 - D. 性交前 3~7 小时
9. 关于产后子宫收缩特点的描述，最正确和恰当的是
- A. 持续性
 - B. 节律性
 - C. 间歇性
 - D. 阵发性
10. 胎儿窘迫最明显的临床征象是
- A. 羊水胎粪污染
 - B. 胎动异常
 - C. 胎心率异常
 - D. 胎儿酸中毒
11. 某产妇，G₁P₁，顺产一男婴，出生体重 3800g，胎儿娩出后立即出现阴道出血约 500ml，血液呈鲜红色，并形成凝血块。此时子宫底脐下一指，胎盘尚未娩出，其出血原因最可能是
- A. 子宫收缩乏力
 - B. 凝血功能障碍
 - C. 软产道裂伤
 - D. 胎盘因素
12. 妊娠合并急性病毒性肝炎产妇的护理措施中，正确的是
- A. 胎儿娩出后不应立即给予缩宫素
 - B. 临产后备好新鲜血液
 - C. 尽量选择剖宫产结束分娩
 - D. 产后可母乳喂养
13. 下列关于妊娠合并缺铁性贫血患者临床表现的描述，错误的是
- A. 消化道不适，恶心、呕吐
 - B. 面色苍白、头晕、无力
 - C. 机体抵抗力低，易发生感染
 - D. 重者可出现贫血性心脏病
14. 第一产程中，为预防尿潴留，待产妇两次排尿时间间隔应为
- A. 0.5~1 小时
 - B. 2~3 小时
 - C. 4~5 小时
 - D. 5 小时以上
15. 下列关于脐带的描述，正确的是
- A. 脐带内有一条脐动脉
 - B. 脐带内有一条脐静脉
 - C. 脐带长度平均约 150cm
 - D. 脐带是连接胎儿和母体的管状器官
16. 第一产程的护理措施中，不正确的是
- A. 每 2 小时听取胎心音 1 次
 - B. 密切观察子宫收缩情况
 - C. 破膜前鼓励待产妇下床活动
 - D. 初产妇宫口开大 3cm 前可给予肥皂水灌肠

17. 葡萄胎术后随访的主要目的是
A. 指导避孕 B. 及早发现恶变
C. 及早发现妊娠 D. 了解盆腔恢复情况
18. 在子宫的韧带中，可使宫颈向上、向后牵引，保持子宫前倾位的韧带是
A. 圆韧带 B. 主韧带
C. 宫骶韧带 D. 骨盆漏斗韧带
19. 子宫颈癌的早期症状是
A. 接触性出血 B. 大小便异常
C. 阴道排液 D. 疼痛
20. 某女，60岁，绝经8年，近日有少量不规则阴道流血，妇检子宫增大、变软，应首先考虑的医疗诊断是
A. 老年性阴道炎 B. 子宫内膜癌
C. 输卵管积水 D. 卵巢癌
21. 某女，已确诊外阴阴道假丝酵母菌病，为改变其阴道酸碱度，可使用的阴道冲洗药液为
A. 0.5%醋酸 B. 1:5000高锰酸钾溶液
C. 2%~4%碳酸氢钠 D. 1%乳酸
22. 剖宫产术的四种切口中，目前临床应用广泛，再次分娩时瘢痕破裂风险小的是
A. 腹膜外剖宫产术 B. 子宫下段纵切口
C. 古典型剖宫产术 D. 子宫下段横切口
23. 胎盘附着面复旧不全引起的晚期产后出血常发生于产后
A. 10多天 B. 20多天
C. 4周 D. 8周
24. 某女，30岁，葡萄胎清宫术后5个月，阴道流血不净，时多时少，伴咳嗽、咯血，血HCG水平明显高于正常水平，首先考虑的医疗诊断是
A. 肺结核 B. 宫外孕
C. 侵蚀性葡萄胎 D. 子宫内膜癌
25. 下列关于卵巢的描述，正确的是
A. 位于圆韧带的前方 B. 绝经后卵巢大小约为4cm×3cm×1cm
C. 髓质内含有大量卵泡 D. 可分泌性激素

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

26. 根据手术切口分类，子宫肌瘤剔除术的切口属于_____类伤口。
27. 有正常周期性排卵妇女的基础体温呈_____型。
28. 育龄妇女如漏服短效口服避孕药应在_____小时内补服。
29. 女性绝育术后要鼓励受术者早期下地活动，应在术后_____小时下床活动。
30. 闭经常见的原因按病变部位分为下丘脑性闭经、_____性闭经、卵巢性闭经和子宫性闭经。
31. 滋养细胞肿瘤阴道转移瘤多发生在阴道_____壁。
32. 胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平，称_____。
33. 新生儿接种卡介苗时，卡介苗应置于_____℃左右的环境保存。
34. 胎盘的结构包括_____、叶状绒毛膜和底蜕膜。
35. 在下丘脑-垂体-卵巢轴的调节过程中，能够分泌雌激素的器官是_____。
36. 子痫前期的处理原则为_____、降压、镇静、合理扩容及必要时利尿，并适时终止妊娠。
37. 在放置产钳时，当胎儿为臀位，胎体娩出后，可使用_____产钳协助娩出胎头。
38. 子宫颈炎进行治疗前应首先进行宫颈刮片检查，以排除_____。
39. 子宫内膜癌的临床处理原则是以_____治疗为主，辅以放疗、化疗和激素等综合治疗。
40. 在第二产程中，胎头在宫缩时暴露于阴道口，宫缩间歇时又缩回阴道内，称为_____。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 原发性闭经
42. 淋病
43. 月经周期
44. 产程停滞
45. 分娩

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述母乳喂养的技巧。
47. 简述胎儿窘迫产妇的护理措施。

48. 简述放置宫内节育器术后的注意事项。
49. 简述绒癌脑转移抽搐患者的护理措施。
50. 简述妊娠合并卵巢肿瘤的护理措施。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某女，患有妇科肿瘤，按医嘱行静脉化疗 1 周后，现白细胞 $3.0 \times 10^9/L$ 。

请回答：

- (1) 该患者出现的化疗不良反应；
- (2) 针对此项不良反应采用的护理措施。

52. 某女，20岁，未婚，有性生活史，以“停经38天，阴道少量出血2天，右下腹胀痛3小时”入院。平素月经规律，月经周期30~32天。查体：血压110/70 mmHg，脉搏85次/分，右下腹轻压痛，无反跳痛和肌紧张，腹部叩诊无移动性浊音。血β-HCG 938.7 mIU/ml。B超检查：宫腔内未见胎囊胎心，右侧附件区有低回声区，提示宫外孕可能性大。

根据以上资料，请回答：

- (1) 对该类患者首选的处理原则；
- (2) 对该类患者的护理措施。