

2022 年 10 月高等教育自学考试

妇产科护理学(一)试题

课程代码:03002

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 妊娠合并心脏病孕妇心脏负荷最重的时期,除外
A. 妊娠 6~8 周 B. 妊娠 32~34 周
C. 分娩期 D. 产后 72 小时内
2. 通常情况下,对诊断子宫肌瘤十分有效的辅助检查方法是
A. 宫腔镜 B. 碘油造影 C. 腹腔镜 D. B 超
3. 妊娠期高血压疾病最主要的病理生理变化是
A. 水钠潴留 B. 全身小动脉痉挛
C. 底蜕膜出血 D. 胎盘绒毛膜退行性变化
4. 关于胎儿血液循环的解剖学特点,下列描述正确的是
A. 1 条脐静脉、1 条脐动脉 B. 2 条脐静脉、2 条脐动脉
C. 1 条脐静脉、2 条脐动脉 D. 2 条脐静脉、1 条脐动脉
5. 在枕左前位分娩机制中,贯穿于整个分娩过程的动作是
A. 衔接 B. 下降 C. 俯屈 D. 内旋转
6. 阴道分泌物增多,呈稀薄泡沫状,常见于
A. 老年性阴道炎 B. 子宫颈炎症
C. 滴虫性阴道炎 D. 外阴炎

7. 某女，21岁，未婚，14岁月经初潮，既往月经规律。近半年因节食减肥造成闭经，考虑其闭经的病变部位最可能是
A. 下丘脑 B. 垂体 C. 卵巢 D. 子宫
8. 关于母乳喂养的技巧，下列描述正确的是
A. 托住乳房的手要靠近乳头 B. 婴儿的头与身体呈一直线
C. 喂养时应固定新生儿头部 D. 婴儿嘴下方露的乳晕比上方多
9. 在子宫韧带中，能使子宫保持前倾位置的韧带是
A. 圆韧带 B. 阔韧带
C. 主韧带 D. 卵巢固有韧带
10. 正常妊娠24周末手测子宫底的高度一般在
A. 脐耻之间 B. 脐下1横指
C. 脐上1横指 D. 耻骨联合上2~3横指
11. 下列属于会阴切开缝合术适应证的是
A. 完全性前置胎盘 B. 绝对头盆不称
C. 子宫先兆破裂 D. 早产儿预防颅内出血
12. 下列描述属于先兆流产特点的是
A. 腹痛重，子宫小于停经周数
B. 少量阴道出血，宫颈口未开
C. 宫颈口已扩张或胎膜已破裂
D. 妊娠产物未排出，阴道分泌物有臭味
13. 葡萄胎病人术后避孕的最佳方法是
A. 免疫避孕法 B. 口服紧急避孕药
C. 安全期避孕 D. 阴茎套或阴道隔膜
14. 某妊娠合并心脏病孕妇，自述平时一般体力活动略受限制，活动后有疲劳、心悸、气急等症状，休息后好转，其心功能分级属于
A. I级 B. II级 C. III级 D. IV级
15. 外阴阴道假丝酵母菌病的主要感染途径是
A. 内源性感染 B. 性交感染
C. 医源性感染 D. 间接感染
16. 下列不属于慢性宫颈炎病理变化的是
A. 宫颈息肉 B. 宫颈肥大
C. 宫颈腺体囊肿 D. 宫颈肌瘤

17. 引起慢性胎儿窘迫最常见的原因是
A. 脐带脱垂 B. 胎盘早期剥离
C. 胎盘功能不全 D. 子宫收缩过强
18. 关于绒毛膜癌的特点, 下列描述正确的是
A. 转移途径主要是淋巴转移 B. 最常见的转移部位是肝脏
C. 阴道转移灶多位于阴道后壁 D. 是高度恶性的滋养细胞肿瘤
19. 关于子宫痉挛性狭窄环的特点, 下列描述正确的是
A. 多数由于子宫畸形造成 B. 狹窄环只发生在宫体部
C. 宫缩具有正常的节律性 D. 应立即实施剖宫产手术
20. 新生儿生理性体重下降可恢复至出生体重的时间是出生后
A. 1~3 天 B. 4~6 天 C. 7~10 天 D. 15~20 天
21. 某女, 35 岁, 半年来月经频发, 经期正常。测基础体温呈双相, 高温相 9~10 天, 考虑其最可能是
A. 无排卵性功血 B. 黄体功能不足
C. 子宫内膜异位症 D. 子宫内膜不规则脱落
22. 关于新生儿出生后的脐带处理, 下列描述正确的是
A. 在脐根处结扎 B. 不可结扎过紧
C. 10%高锰酸钾溶液消毒断端 D. 高锰酸钾溶液不可触及皮肤
23. 关于产褥感染的护理措施, 下列描述正确的是
A. 注意保持会阴清洁 B. 取左侧卧位, 促进恶露排出
C. 定期进行阴道检查 D. 减少水分摄入, 保持水电解质平衡
24. 关于妇科肿瘤化疗患者出现血小板减少的护理措施, 下列不正确的是
A. 了解患者化疗的进程及血象变化
B. 嘱患者休息, 不做剧烈活动
C. 鼻腔有少量出血时, 立即行鼻腔填塞
D. 进行各项护理治疗操作时动作要轻柔
25. 女性不孕症病因中属于子宫因素的是
A. 阴道畸形 B. 甲状腺功能减退
C. 输卵管狭窄 D. 子宫内膜病变

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

26. 妊娠期糖尿病患者的血糖控制除饮食控制外，_____治疗是控制血糖最安全的办法。
27. 自月经第 1 日起至下次月经第 1 日的时间间隔称为_____。
28. 妊娠期孕妇血液处于_____状态，易发生下肢静脉血栓。
29. 新生儿_____是衡量生长发育与营养吸收程度的重要指标。
30. 在实行胎头吸引器助产时，牵引一般不宜超过_____次。
31. 滋养细胞肿瘤脑转移患者腰穿时放脑脊液速度不宜过快，防止形成_____。
32. 紧急避孕常用的方法是放置_____和服用紧急避孕药物。
33. 乳汁的分泌在很大程度上取决于哺乳时的_____刺激。
34. 子宫收缩乏力根据发生时间可分为_____和继发性宫缩乏力两种类型。
35. 输卵管妊娠的三个主要症状是_____、阴道出血和腹痛。
36. 妇科手术患者术前备皮后淋浴时应特别注意清洁_____及外阴部。
37. 妇科肿瘤患者应用甲氨蝶呤化疗时，要嘱患者多喝水，24 小时尿量需要大于_____ml。
38. 子宫内膜异位症的治疗原则是去除病灶、减轻症状、促进妊娠、_____、个体化治疗。
39. 阴道镜检查前在宫颈表面涂以复方碘液，正常鳞状上皮被染为_____色。
40. 妇科肿瘤患者应用平阳霉素大剂量化疗可能造成不可逆的_____，表现为呼吸困难、憋气、气短。
- 三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。
41. 分娩
42. 前置胎盘
43. 葡萄胎
44. 淋病
45. 诊断性刮宫

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述巨大胎儿分娩过程中的处理原则。
47. 简述宫缩乏力所致产后出血的特点。
48. 简述围绝经期综合征患者潮热的表现。
49. 简述预防妇科手术患者伤口感染的护理措施。
50. 简述中期妊娠终止患者产后的护理措施。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某女士，31岁，会阴侧切分娩一女婴，出生体重4000g，总产程22小时，产房观察2小时后安返病房。2小时后，护士发现其子宫底较前升高，位于脐上1横指，膀胱充盈明显。产妇自述回病房后一直卧床休息，排尿困难，未解小便。

根据以上资料，请回答：

- (1) 导致该产妇排尿困难的原因；
 - (2) 协助该类产妇排尿的方法；
 - (3) 该类产妇发生尿潴留的护理措施。
52. 某女士，42岁，G₂P₁。平素月经规律，1年前开始出现性生活后少量阴道出血，现经检查确诊为宫颈癌Ⅱ期，采用放射治疗，进行体外照射。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者出现急性皮肤反应的表现；
- (2) 该类患者的皮肤护理措施。