

# 2023 年 4 月高等教育自学考试 妇产科护理学(一)试题

课程代码:03002

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

## 选择题部分

### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:**本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在临近预产期及分娩前为妊娠合并病毒性肝炎患者肌注维生素 K<sub>1</sub>的目的是  
A. 预防产后出血                            B. 改善肝功能  
C. 阻断母婴传播                            D. 预防新生儿过敏
2. 关于子宫内膜不规则脱落患者的临床表现,下述描述正确的是  
A. 基础体温呈单相型                      B. 月经周期缩短  
C. 月经量偏少                                D. 经期延长
3. 正常情况下,妊娠 18~20 周时胎动每小时约  
A. 1~2 次                                    B. 3~5 次                                    C. 6~8 次                                    D. 10 次以上
4. 绒毛膜癌最常见的转移部位是  
A. 肺    B. 肝    C. 脑    D. 阴道
5. 正常育龄期妇女输卵管的长度约为  
A. 3~7 cm                                    B. 8~14 cm  
C. 15~21 cm                                    D. 22~28 cm
6. 中骨盆狭窄的产妇,分娩过程中最容易出现  
A. 枕左前位                                    B. 胎头跨耻征阳性  
C. 持续性枕后位                            D. 胎先露入盆受阻

7. 颅咽管瘤造成的闭经，病变部位最可能是  
A. 下丘脑      B. 垂体      C. 卵巢      D. 子宫
8. 在剖宫产术的四种切口中，子宫下段横切口的特点是  
A. 术中出血多      B. 损伤膀胱危险性较高  
C. 切口对合不易      D. 再次分娩瘢痕破裂风险小
9. 未孕妇女如子宫肌瘤生长过快，因血运不足可继发变性，常见的是  
A. 恶性变      B. 肉瘤变      C. 玻璃样变      D. 红色变性
10. 产妇宫颈完全恢复至正常状态的时间是产后  
A. 3周      B. 4周      C. 5周      D. 6周
11. 子宫内膜癌患者就诊的常见主诉是  
A. 阴道出血      B. 外阴瘙痒  
C. 腰骶部疼痛      D. 盆腔包块
12. 糖尿病孕妇应用胰岛素控制血糖，注射胰岛素的时间应在  
A. 晨起30分钟      B. 餐前30分钟  
C. 餐后30分钟      D. 睡前30分钟
13. 下列属于难免流产临床表现的是  
A. 腹痛减轻，子宫小于停经月份      B. 少量阴道出血，宫颈口未开  
C. 宫颈口已扩张或胎膜已破裂      D. 腹痛重，部分妊娠产物已排出
14. 下列属于产褥感染的是  
A. 乳腺炎      B. 子宫内膜炎  
C. 尿道炎      D. 支气管炎
15. 在分娩过程中，产力的主要力量是  
A. 腹肌收缩力      B. 膈肌收缩力  
C. 子宫收缩力      D. 肛提肌收缩力
16. 下列不属于绒毛膜癌病理变化的是  
A. 滋养细胞极度不规则增生并分化不良  
B. 滋养细胞侵入肌层和血管，伴有远处转移  
C. 肉眼可见数量不等的紫蓝色结节  
D. 显微镜下可见排列杂乱的绒毛结构

17. 某产妇，产后出血特点表现为胎盘娩出后大量出血，色暗红，有血块，子宫轮廓不清、质软，其出血原因最可能是  
A. 宫缩乏力                                   B. 胎盘滞留  
C. 产道损伤                                   D. 凝血功能障碍
18. 严重会阴水肿的产妇局部湿敷宜采用的是  
A. 1:5000 高锰酸钾溶液                   B. 1:40 硼酸碘溶液  
C. 2%~4% 碳酸氢钠溶液                   D. 50% 硫酸镁溶液
19. 关于新生儿呼吸运动的特点，下列描述正确的是  
A. 呼吸表浅                                   B. 效能较高                                   C. 节律规则                                   D. 频率较慢
20. 临幊上可通过定期测量血 CA125 进行病情监测的卵巢肿瘤是  
A. 成熟畸胎瘤                               B. 内胚窦瘤  
C. 上皮性肿瘤                               D. 颗粒细胞瘤
21. 关于输卵管通畅检查的护理要点，下列描述不正确的是  
A. 术前测体温                               B. 应在月经第 3~7 天内进行  
C. 注液不宜过快过多                       D. 术后观察 30 分钟无异常方可离开
22. 宫内节育器放置术后的注意事项，下列描述正确的是  
A. 2 周内避免重体力劳动                   B. 4 周内禁止性生活及盆浴  
C. 3 个月内注意观察有无节育器脱落   D. 1、2、3 个月各随访一次，以后每年随访
23. 下列属于手术流产禁忌证的是  
A. 妊娠剧吐                                   B. 2 型糖尿病  
C. 轻度贫血                                   D. 生殖道炎症
24. 某女士，28 岁，既往月经规律，无痛经，3 年前开始出现痛经，逐渐加重。现行腹腔镜检查可见卵巢囊肿，内有巧克力样液体。考虑其痛经最可能的原因是  
A. 原发性痛经                               B. 子宫内膜炎  
C. 子宫肌瘤                                   D. 子宫内膜异位症
25. 关于葡萄胎的临床表现，下列描述错误的是  
A. 腹痛                                       B. 子宫增长速度慢  
C. 黄素化囊肿                               D. 停经及阴道出血

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

26. 淋病是由\_\_\_\_\_菌引起的一种性传播疾病。
27. 正常妊娠\_\_\_\_\_周后，可在耻骨联合上扪及子宫底。
28. 围绝经期功血的治疗原则是止血和调整\_\_\_\_\_。
29. 初乳具有\_\_\_\_\_的作用，能促进胎粪的排出。
30. 避孕药的作用机制是\_\_\_\_\_、干扰受精和受精卵着床。
31. 胎儿异常分为\_\_\_\_\_异常和胎儿发育异常。
32. 巨幼细胞性贫血是因为缺乏\_\_\_\_\_或维生素 B<sub>12</sub>而引起的贫血。
33. 女性外生殖器官包括\_\_\_\_\_、大阴唇、小阴唇、阴蒂和阴道前庭。
34. 发现宫颈癌前期病变和早期宫颈癌的主要方法是\_\_\_\_\_。
35. 新生儿出生后所有处理应在\_\_\_\_\_的情况下进行。
36. 根据胎盘边缘与子宫颈内口的关系，前置胎盘分为边缘性、\_\_\_\_\_、完全性前置胎盘。
37. 妇科手术切口分为三类，其中 I 类为\_\_\_\_\_切口。
38. 在妇科检查中，腹部、阴道、直肠联合检查，称\_\_\_\_\_检查。
39. 分娩 24 小时后，在产褥期内阴道大量出血称为\_\_\_\_\_。
40. 根据胎心率与宫缩的关系，胎心率减速分为三种：早期减速、\_\_\_\_\_减速、晚期减速。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

41. 恶露
42. 胎盘早剥
43. 子宫肌瘤
44. 围绝经期综合征
45. 绝对不孕

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

46. 简述妊娠期胎儿的正常胎势。
47. 简述胎盘因素导致产后出血的治疗原则。
48. 简述会阴切开缝合术后的护理措施。
49. 简述妇科手术前护士向患者讲解尿管护理的注意事项。
50. 简述妇科肿瘤化疗患者血小板减少易发生出血的部位及症状。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

51. 某女，27岁，孕40周，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>。于今晨出现规律宫缩，30s/3~4min，胎心140次/分。阴道检查：宫颈口未开，产道未见明显异常，胎位正常，B超预估胎儿体重3000g，入院待产。在待产过程中，产妇极度紧张、焦虑，产程进展缓慢。

根据以上资料，请回答：

- (1) 在影响分娩的四大因素中，导致该产妇产程进展缓慢的主要因素；
- (2) 针对该类产妇提供的宣教内容及护理措施。

52. 某女，30岁，主诉：白带增多，外阴瘙痒伴灼热感1周。妇科检查：阴道粘膜充血，有散在红色斑点，白带呈泡沫状，灰黄色，质稀薄。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该病人最可能的医疗诊断；
- (2) 为明确诊断，应进一步进行的辅助检查；
- (3) 针对该类病人提供的护理措施。