

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(二)试题  
课程代码:03010

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 宫颈腺癌对放疗的敏感度属于
  - A. 高度敏感
  - B. 中度敏感
  - C. 低度敏感
  - D. 不敏感
2. 外阴癌术后患者应采取的体位是
  - A. 平卧位外展屈膝
  - B. 半卧位外展屈膝
  - C. 侧卧位屈膝
  - D. 平卧位外展双腿伸直
3. 某女,孕 11 周,因阴道流血、下腹部疼痛就诊。查体:宫颈口已扩张,可见胎囊,子宫大小与停经周数相符,该患者的医疗诊断首先应考虑
  - A. 先兆流产
  - B. 难免流产
  - C. 不全流产
  - D. 完全流产
4. 关于阴道镜检查的护理要点,下列描述正确的是
  - A. 术后常规应用抗生素
  - B. 术前 1 周禁止阴道上药
  - C. 术后 4 周禁止性生活及盆浴
  - D. 为使宫颈组织净化并肿胀可应用 3% 冰醋酸

5. 关于胎心率基线，下列描述错误的是
- A. 胎心率>160 次/分，历时 10 分钟称心动过速
  - B. 胎心率<120 次/分，历时 10 分钟称心动过缓
  - C. 基线摆动包括胎心率的变异振幅和变异频率
  - D. 出现基线摆动表示胎儿储备能力丧失
6. 外阴急性炎症时，可选用的局部涂擦药物是
- A. 40%的氧化锌油膏
  - B. 25%-50%的百部酊
  - C. 2%的苯海拉明软膏
  - D. 1%的马拉硫磷软膏
7. 关于双胎妊娠，下列描述正确的是
- A. 单卵双胎占双胎妊娠的 1/2
  - B. 分娩方式均应选择剖宫产术
  - C. 妊娠期应鼓励孕妇多食多餐
  - D. 妊娠最后 2-3 个月应卧床休息
8. 某女，32 岁，6 个月前经阴道分娩一健康男婴，现母乳喂养。要求避孕，查体无异常，首选的避孕方法是
- A. 口服避孕药
  - B. 使用长效避孕针
  - C. 应用安全期避孕法
  - D. 放置宫内节育器
9. 关于葡萄胎的处理，下列描述正确的是
- A. 一旦确诊应迅速清除子宫腔内容物
  - B. 行一次清宫术即可吸刮干净
  - C. 如行子宫切除术应同时切除卵巢
  - D. 清宫术后常规配合化疗
10. 正常妊娠 36 周末时，手测宫底高度约在
- A. 脐上 1 横指
  - B. 脐上 3 横指
  - C. 脐与剑突之间
  - D. 剑突下 2 横指
11. 关于绒毛膜癌，下列描述正确的是
- A. 恶性程度低于侵蚀性葡萄胎
  - B. 绒毛膜癌可继发于葡萄胎
  - C. 病理可见变性绒毛结构
  - D. 主要经淋巴途径转移
12. 关于羊水过少，下列描述正确的是
- A. 孕妇常合并高血压疾病
  - B. 羊水指数≤8 诊断为羊水过少
  - C. 羊水过少者约 1/5 有胎儿畸形
  - D. 羊水过少可导致围生儿死亡率增加
13. 关于口服避孕药的注意事项，下列描述正确的是
- A. 如有生育要求，应提前 3 个月停药
  - B. 短效口服避孕药若漏服应在 12 小时内补服
  - C. 糖衣片避孕药若糖衣潮解可晾干后继续服用
  - D. 产后妇女尚未行经者必须于第一次月经第 5 日开始服药

14. 最常见的妇科恶性肿瘤是  
A. 子宫体癌      B. 子宫颈癌  
C. 卵巢畸胎瘤      D. 卵巢纤维瘤
15. 某女，孕 39 周，胎位 LOA，现宫口开大 7cm，宫缩间隔 2 分钟，持续 45 秒，产妇为加快产程进展，主动屏气用力。此时如不及时给予指导，其最可能出现的问题是  
A. 胎盘早剥      B. 子宫收缩过强  
C. 宫颈水肿      D. 先兆子宫破裂
16. 最常见的子宫肌瘤是  
A. 浆膜下肌瘤      B. 肌壁间肌瘤  
C. 粘膜下肌瘤      D. 子宫颈肌瘤
17. 在婚前咨询中，如果男女任何一方患严重的常染色体显性遗传病，此时给出的婚育建议是  
A. 暂缓结婚      B. 可以结婚，限制生育  
C. 不能结婚      D. 可以结婚，禁止生育
18. 关于脐带脱垂的预防及护理措施，下列描述正确的是  
A. 人工破膜时应在宫缩时进行  
B. 羊水偏多者应采用低位破膜  
C. 脐带脱垂时均应立即行剖宫产  
D. 脐带脱垂时应立即抬高臀部并将胎先露部上推
19. 某孕妇，孕 38 周，无宫缩，胎心 148 次/分，估计胎儿体重 3800g 左右，跨耻征阳性，其最佳的分娩方式是  
A. 阴道分娩      B. 阴道助产  
C. 择期剖宫产      D. 试产，如有异常行剖宫产
20. 为找出闭经原因，了解病变所在部位，首先应进行的检查是  
A. 孕激素试验      B. 雌激素试验  
C. 促性腺激素测定      D. 垂体兴奋试验
21. 某女，孕 35 周，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，双胎妊娠，1 小时前因阴道流水入院。查体：胎心率正常，无宫缩，阴道液涂片检查可见羊齿植物叶状结晶。该孕妇的医疗诊断首先应考虑  
A. 早产      B. 临产  
C. 先兆临产      D. 胎膜早破
22. 妊娠期母体循环血量达到高峰的时间是  
A. 24-26 周      B. 28-30 周  
C. 32-34 周      D. 36-38 周

23. 子宫内膜异位症的典型症状是  
A. 痛经                                   B. 月经失调  
C. 不孕                                   D. 性交痛
24. 下列产后出血的合并症中，禁用麦角新碱治疗的是  
A. 肝炎                                   B. 贫血  
C. 心脏病                               D. 糖尿病
25. 尿瘘患者术后应采取的卧位是  
A. 瘘孔应低于尿液面                   B. 瘘孔应高于尿液面  
C. 瘘孔应平行于尿液面              D. 取任何舒适体位
26. 某女，28岁，既往体健，妊娠 $28^{+2}$ 周，G<sub>2</sub>P<sub>0</sub>。近期有多饮、多尿、多食症状。超声检查发现羊水过多，胎儿未见明显畸形，但胎儿双顶径大于妊娠周数。为明确诊断，应首选检查的项目是  
A. 血脂系列检查                        B. 夫妇双方血型检查  
C. 血清病毒系列检查                  D. 口服葡萄糖耐量试验
27. 下列妇科常用化疗药物中，属于细胞周期非特异性药物的是  
A. 甲氨蝶呤                            B. 环磷酰胺  
C. 长春新碱                            D. 阿糖胞苷
28. 关于妇科腹部手术术前准备内容，下列描述正确的是  
A. 术前留置导尿管  
B. 术前1日遵医嘱给予抗生素  
C. 卵巢肿瘤细胞减灭术术前1日行肠道准备  
D. 子宫肌瘤剔除术前阴道冲洗后在子宫颈及穹隆处涂龙胆紫
29. 关于产褥感染的处理原则，下列描述正确的是  
A. 选用抗病毒药物治疗                B. 产后3天可药物坐浴  
C. 宫腔感染者应取半坐卧位           D. 血栓静脉炎治疗时禁用肝素
30. 减轻妇科腹腔镜术后腹胀的护理措施是  
A. 禁食                                   B. 吸氧  
C. 半卧位                               D. 多说话

## 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 关于外阴鳞状上皮增生，下列描述正确的是

- A. 多见于老年妇女
- B. 确诊靠组织病理学检查
- C. 主要症状为病损区皮肤发痒
- D. 药物治疗的目的在于控制局部瘙痒
- E. 主要病理变化为表皮角化过度和角化不全

32. 下列属于不宜妊娠的心脏病患者包括

- A. 年龄在 35 岁以下，心脏病史 2 个月者
- B. 风湿性心脏病患者有肺动脉高压
- C. 出现严重心律失常
- D. 既往有心力衰竭史
- E. 心功能 II 级

33. 关于滋养细胞肿瘤肺转移患者的护理，下列描述正确的是

- A. 大量咯血时给予头低侧卧位
- B. 呼吸困难者给予半卧位并吸氧
- C. 按医嘱给予镇静剂及化疗药物
- D. 经常下床活动以增加机体抵抗力
- E. 大量咯血时应轻拍背部排出积血

34. 关于胎动计数，下列描述正确的是

- A. 正常时每小时胎动约 3~5 次
- B. 胎动<10 次/12 小时，提示胎儿缺氧
- C. 缺氧的早期胎动次数减少
- D. 缺氧严重时胎动次数增加
- E. 胎动消失后胎心音迅速消失

35. 关于妇科腹部手术术后出院指导的内容，下列描述正确的是

- A. 术后 1-2 周阴道有少量粉红色分泌物应立即就诊
- B. 伤口拆线后出现红肿硬结应立即就诊
- C. 子宫肌瘤剔除术后 3 个月禁性生活
- D. 伤口拆线一周可洗盆浴
- E. 术后 6 周复诊

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

36. 紧急避孕
37. 产前诊断
38. 诊断性刮宫
39. 产褥感染
40. 不孕症

### 四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 简述宫颈癌患者出院指导内容。
42. 简述软产道撕裂伤所致产后出血的止血措施。
43. 简述妊娠合并病毒性肝炎患者产褥期指导新生儿喂养的内容。
44. 简述妇科化疗患者口腔溃疡的护理措施。
45. 简述不协调性宫缩乏力的护理措施。

### 五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 某女，36 岁，初产妇，孕 30 周，因近日头晕、头痛就诊。查体：血压 140/90mmHg，胎心率、胎位正常，24 小时尿蛋白 300mg。该孕妇既往无高血压、慢性肾炎及糖尿病史。

根据以上资料请回答：

- (1) 该患者最可能的医疗诊断（2 分）。
- (2) 该类疾病患者产时及产后的护理措施（8 分）。
47. 某女，48 岁，因“月经不规律半年余”就诊。患者主诉近半年来月经周期缩短，经量减少为原经量的 1/2。夜间常因突然出汗而醒。同时，患者出现膝关节和腕关节的疼痛不适。查体未见器质性疾病，激素检查见雌二醇（E<sub>2</sub>）水平下降、促卵泡素（FSH）水平升高。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该患者最可能的医疗诊断（2 分）。
- (2) 该类患者的护理措施（8 分）。