

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(二)试题  
课程代码:03010

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 导致女性不孕最常见的因素是  
A. 输卵管因素  
B. 子宫因素  
C. 阴道因素  
D. 卵巢因素
2. 在产前诊断中发现下列情况, 属于遗传性代谢缺陷病的是  
A. 脊柱裂  
B. 21-三体综合征  
C. 苯丙酮尿症  
D. 先天卵巢发育不全
3. 导致尿瘘最主要的原因是  
A. 产伤  
B. 妇科手术损伤  
C. 长期放置子宫托  
D. 泌尿系统结核浸润
4. 子痫患者在发生抽搐时, 首要的护理措施是  
A. 保持绝对安静  
B. 保持呼吸道通畅  
C. 取左侧卧位  
D. 监测生命体征
5. 葡萄胎最常见的症状是  
A. 妊娠呕吐  
B. 停经后阴道流血  
C. 子宫增大、变软  
D. 甲状腺功能亢进征象

6. 某女, 曾自然流产 3 次, 检查后确诊主要原因是宫颈内口松弛所致。现已妊娠 6 周, 若行子宫内口环扎术, 手术时间可选择在妊娠
- A. 6~8 周  
B. 10~12 周  
C. 14~16 周  
D. 18~20 周
7. 关于妇科患者术后体位, 下列描述正确的是
- A. 外阴癌根治患者术后应采取半卧位  
B. 盆底修补术患者术后应采取平卧位  
C. 处女膜闭锁切开术患者术后应采取平卧位  
D. 阴道前后壁修补术患者术后应采取半卧位
8. 下列产科检查结果中, 不属于前置胎盘患者体征的是
- A. 胎方位清楚  
B. 胎先露高浮  
C. 宫颈举痛明显  
D. 子宫大小与停经月份一致
9. 关于妇科手术后患者的护理措施, 下列描述正确的是
- A. 广泛全子宫切除术后留置尿管 7~8 天  
B. 会阴 III 度裂伤修补术后进少渣饮食  
C. 子宫脱垂患者手术后 12 小时可拔除尿管  
D. 术后 1~2 天体温升高达到 39℃ 可继续观察
10. 某孕妇被诊断为羊水过多, 需行羊膜腔穿刺术放羊水, 一次放羊水的量最多不能超过
- A. 500ml  
B. 800ml  
C. 1000ml  
D. 1500ml
11. 某女, 产后 12 天, 阴道分泌物多且有臭味, 阴道伤口愈合不良, 需行阴道灌洗治疗。下列护理措施中正确的是
- A. 需行高位阴道灌洗  
B. 灌洗液温度以 35℃ 为宜  
C. 灌洗头应插入到阴道后穹窿处  
D. 灌洗筒高度应高于床沿 30cm
12. 对怀疑有腹腔内出血的异位妊娠患者, 下列简单可靠的诊断性检查方法是
- A. 妊娠试验  
B. 宫腔镜检查  
C. 子宫内膜病理检查  
D. 阴道后穹窿穿刺
13. 关于输卵管通畅检查的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 注射生理盐水时应快速完成  
B. 生理盐水需加温至 32℃  
C. 术后观察 2 小时  
D. 术后禁盆浴 2 周

14. 某合并心脏病的孕妇主诉一般体力活动受限制，活动后出现有心悸、气短等情况，其心功能属于
- A. I 级  
B. II 级  
C. III 级  
D. IV 级
15. 下列属于良性卵巢肿瘤的是
- A. 未成熟畸胎瘤  
B. 颗粒细胞瘤  
C. 内胚窦瘤  
D. 纤维瘤
16. 关于先兆子宫破裂的临床表现，下列描述正确的是
- A. 胎心消失  
B. 全腹剧痛  
C. 病理缩复环  
D. 大量阴道流血
17. 目前发现宫颈癌前期病变的主要方法是
- A. 碘试验  
B. 阴道镜检查  
C. 宫颈活体组织检查  
D. 宫颈刮片细胞学检查
18. 胎心监护时，发现胎心率基线 145 次/分，胎心波动范围 10~25 次/分，此情况为
- A. 胎儿心动过速  
B. 胎儿心动过缓  
C. 胎心率基线摆动  
D. 胎心率基线平直
19. 子宫肌瘤最常见的症状是
- A. 下腹坠胀  
B. 月经改变  
C. 压迫症状  
D. 下腹包块
20. 子宫收缩过强对母儿的影响不包括
- A. 胎盘粘连  
B. 胎儿窘迫  
C. 新生儿外伤  
D. 产道损伤
21. 当子宫内膜癌病变局限于子宫体时，其分期属于
- A. 0 期  
B. I 期  
C. II 期  
D. III 期
22. 急产是指总产程时间少于
- A. 1 小时  
B. 2 小时  
C. 3 小时  
D. 4 小时

23. 关于葡萄胎患者的健康教育, 下列描述正确的是
- A. 每次刮宫术后禁止性生活及盆浴 3 个月
  - B. 刮宫术后 6 个月内每周随访一次
  - C. 随访期间必须坚持严格避孕 1 年
  - D. 避孕措施首选药物避孕
24. 关于妊娠合并糖尿病妇女分娩后的处理, 下列描述错误的是
- A. 新生儿一律按高危儿处理
  - B. 预防产褥期感染, 保持皮肤清洁
  - C. 建议人工喂养新生儿
  - D. 定期产科及内科复查
25. 某女士, 60 岁, 全子宫切除术后第一天, 为防止发生下肢静脉血栓, 下列护理措施正确的是
- A. 发现足背动脉搏动减弱立即报告
  - B. 遵医嘱使用立止血
  - C. 术后取头低脚高位
  - D. 绝对卧床休息
26. 关于病毒性肝炎对母儿的影响, 下列描述正确的是
- A. DIC 发生率降低
  - B. 早孕反应减轻
  - C. 凝血因子合成增加
  - D. 产后出血发生率增加
27. 治疗外阴硬化性苔藓的标准方法是
- A. 糖皮质激素局部涂擦
  - B. 氢化可的松软膏局部涂擦
  - C. 肤轻松软膏局部涂擦
  - D. 丙酸睾酮局部涂擦
28. 妊娠期贫血最常见的是
- A. 缺铁性贫血
  - B. 再生障碍性贫血
  - C. 慢性失血性贫血
  - D. 巨幼红细胞性贫血
29. 关于外阴疾病, 下列描述正确的是
- A. 外阴瘙痒的患者可选用肥皂水擦洗
  - B. 幼女硬化性苔藓可局部病灶切除治疗
  - C. 外阴瘙痒有感染者可用 1:5000 高锰酸钾坐浴
  - D. 外阴癌目前主要的治疗方案是手术、放疗和化疗联合治疗
30. 关于妊娠合并心脏病患者的分娩期处理, 下列描述错误的是
- A. 避免产妇屏气用力
  - B. 分娩时尽量采用半坐卧位
  - C. 及时协助胎盘娩出
  - D. 产后出血时立即静脉注射麦角新碱

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 护士在为孕妇进行胎动计数指导时，下列内容正确的是
- A. 胎动计数是孕妇自我监测胎儿的简便、安全可靠的方法
  - B. 胎动计数 $<10$ 次/12小时，提示胎儿缺氧
  - C. 正常时每小时胎动约 3~5 次
  - D. 缺氧的早期胎动次数减少
  - E. 缺氧严重时胎动次数增加
32. 护士在向妇女介绍腹腔镜手术优点时，下列内容正确的是
- A. 手术费用少
  - B. 住院时间短
  - C. 术后恢复快
  - D. 手术创伤小
  - E. 术后并发症少
33. 心脏病孕产妇的主要死亡原因是
- A. 妊娠期高血压
  - B. 胎盘早期剥离
  - C. 心力衰竭
  - D. 产后出血
  - E. 感染
34. 关于子宫内膜异位症的预防及护理措施，下列描述正确的是
- A. 经期应防止体位改变引起经血逆流
  - B. 患者应避免剧烈活动以免出现巧克力囊肿破裂
  - C. 药物治疗时患者可根据症状自行决定用药与否
  - D. 避免在经期同房，预防子宫内膜异位症的发生
  - E. 有生育要求者可在手术治疗后两年内采用助孕方法
35. 新生儿发生 ABO 溶血多见于
- A. 母亲 O 型血，父亲 AB 型血
  - B. 母亲 O 型血，父亲 B 型血
  - C. 母亲 AB 型血，父亲 O 型血
  - D. 母亲 B 型血，父亲 O 型血
  - E. 母亲 O 型血，父亲 A 型血

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36. 巨大儿
37. 后装治疗
38. 前置胎盘
39. 接触性出血
40. 人工剥离胎盘术

### 四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

41. 列出 5 项人工流产负压吸引术常见的并发症。
42. 简述重型胎盘早剥的临床症状。
43. 简述目前产前咨询中咨询对象提出的主要问题。
44. 简述侵蚀性葡萄胎脑转移患者的护理。
45. 简述胎盘、胎膜残留导致晚期产后出血的临床表现。

### 五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

46. 某女,21 岁,学生,因“初潮起月经不规律 7 年,经量增多 2 年”就诊。患者 14 岁初潮,月经周期 2 个月至半年,每次月经持续 3~5 天,量少,每次用 3~4 片卫生巾。两年前开始出现经量增多,每次用卫生巾 40~50 片,每次持续 10 天左右,月经周期仍不规律,曾有 2 次因“经量多”晕倒。妇科检查及 B 超检查均未见异常。

根据以上资料,请回答:

(1) 该患者可能的医疗诊断(2 分)。

(2) 该类患者的护理措施(8 分)。

47. 某女,初产臀位,孕 38 周,临产后自然破膜。查体:胎心率 116 次/分,阴道检查在胎先露部前方可触及有搏动的条索状物。

根据以上资料,请回答:

(1) 该患者主要的医疗诊断(2 分)。

(2) 该类患者在治疗期间的护理措施(8 分)。