

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(二)试题
课程代码:03010

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 第一产程中潜伏期延长的定义是指潜伏期时间超过
 - A. 16 小时
 - B. 14 小时
 - C. 12 小时
 - D. 8 小时
2. 关于葡萄胎患者腹痛的原因,下列描述正确的是
 - A. 阴道流血
 - B. 子宫破裂
 - C. 胎死宫内
 - D. 子宫过度扩张
3. 关于产后抑郁症的处理,下列描述正确的是
 - A. 轻度抑郁症患者需尽早应用抗抑郁药物
 - B. 三环类抗抑郁药物不会大量进入母乳内
 - C. 产后抑郁症患者一年内治愈率为 50%
 - D. 治愈后再次妊娠者复发率为 10%
4. 为孕妇进行胎心监护时发现胎心出现变异减速,此种情况可能是
 - A. 胎儿活动所致
 - B. 胎儿躯干暂时受压所致
 - C. 脐带受压兴奋迷走神经所致
 - D. 胎头受压脑血流量一时性减少所致

5. 慢性活动性肝炎患者早期妊娠时，正确的处理措施是
- A. 治疗后终止妊娠
 - B. 积极治疗，继续妊娠
 - C. 注意休息，预防发生流产
 - D. 遵医嘱用药，避免发生妊娠期高血压疾病
6. 关于滋养细胞疾病，下列描述正确的是
- A. 滋养细胞疾病均继发于妊娠
 - B. 滋养细胞疾病是一组恶性肿瘤疾病
 - C. 滋养细胞疾病是来源于子宫壁的疾病
 - D. 滋养细胞在正常妊娠时侵袭能力仅限于蜕膜层
7. 为缺铁性贫血的孕妇做孕期宣教，正确的是
- A. 铁剂应在餐前服用
 - B. 服铁剂时应同时服用维生素 C
 - C. 注射铁剂时应采用常规肌内注射
 - D. 服铁剂后大便变黑要及时去医院检查
8. 外阴癌最常见的发病部位是
- A. 阴道
 - B. 阴蒂
 - C. 大阴唇
 - D. 小阴唇
9. 我国妇女常见的入口平面狭窄的骨盆类型是
- A. 均小骨盆
 - B. 漏斗骨盆
 - C. 扁平骨盆
 - D. 畸形骨盆
10. 治疗阴虱引起的外阴瘙痒时，可选用的局部涂擦药物是
- A. 2%~4%氧化锌油膏
 - B. 25%~50%百部酊
 - C. 20%苯海拉明软膏
 - D. 40%皮质激素软膏
11. 关于协调性宫缩乏力，下列描述正确的是
- A. 子宫收缩极性倒置
 - B. 可出现痉挛性狭窄环
 - C. 宫缩的兴奋点来自子宫下段
 - D. 宫缩有节律性、极性和对称性
12. 子宫内膜癌主要的转移途径是
- A. 直接蔓延
 - B. 血行转移
 - C. 淋巴转移
 - D. 性传播
13. 某女，21岁，大学三年级学生，因节食减肥造成闭经8个月，垂体兴奋试验阳性，其病变部位最可能是
- A. 子宫
 - B. 卵巢
 - C. 垂体
 - D. 下丘脑

14. 关于葡萄胎的处理，下列描述正确的是
A. 清宫后常规化疗和放疗联合治疗 B. 黄素化囊肿患者应行囊肿切除术
C. 一旦确诊应迅速清除子宫腔内容物 D. 葡萄胎清宫一般一次吸刮即可干净
15. 某女士，65岁，子宫脱垂Ⅱ度，无其他合并症，如需手术治疗，首先考虑的手术方式是
A. 开腹手术 B. 阴式手术
C. 宫腔镜手术 D. 腹腔镜手术
16. 导致羊水栓塞的原因不包括
A. 血窦开放 B. 子宫收缩过强
C. 第一产程延长 D. 羊膜腔内压力过高
17. 妇科肿瘤化疗时，适用鞘内注射的肿瘤转移部位是
A. 肺 B. 脑
C. 肝 D. 阴道
18. 关于糖尿病对孕妇的影响，下列描述正确的是
A. 合并感染率降低 B. 羊水过少发生率增加
C. 难产发生率降低 D. 易发生糖尿病酮症酸中毒
19. 妇科肿瘤患者放疗出现骨髓抑制时，首先减少的血细胞是
A. 血小板 B. 晚幼红细胞
C. 网织红细胞 D. 中性粒细胞
20. 产后母亲不宜哺乳的情况是
A. HBeAg 阳性 B. HBsAg 阳性
C. 合并糖尿病 D. 合并贫血
21. 关于阴道灌洗的护理要点，下列描述正确的是
A. 灌洗头弯头应向下置入 B. 灌洗液温度以30~32℃为宜
C. 灌洗筒与床沿距离不超过80cm D. 无性生活史者可用导尿管进行灌洗
22. 护士在为某孕妇进行胎心监护时，发现胎心率基线165次/分，并持续15分钟，此情况属于
A. 胎儿心动过速 B. 胎儿心动过缓
C. 胎心率基线平直 D. 胎心率基线摆动
23. 关于阴道后穹穿刺术，下列描述正确的是
A. 取7号长针头进行穿刺
B. 是诊断宫外孕破裂出血的辅助方法
C. 不适用于可疑有腹腔内脓液的患者
D. 穿刺液放置3分钟不凝血，说明腹腔内有出血

24. 产前诊断中发现下列情况，其中属于性连锁遗传病的是
A. 无脑儿 B. 血友病
C. 唇腭裂 D. 黏多糖增多症
25. 可以防止性传播疾病的避孕方法是
A. 阴茎套 B. 紧急避孕
C. 宫内节育器 D. 口服短效避孕药
26. 某女，孕 39 周，G₁P₀，临产后出现继发性宫缩乏力，潜伏期延长，行人工破膜。破膜后不久，产妇突然出现烦躁不安，呛咳，呼吸困难，心率加快，肺部听诊可闻及湿啰音。该产妇最可能的医疗诊断是
A. 胎盘早剥 B. 急性肺炎
C. 羊水栓塞 D. 子宫破裂
27. 关于人工流产吸宫术后妇女的健康宣教，下列描述正确的是
A. 住院观察 2 天 B. 每日用温开水清洗会阴
C. 休息 4 周 D. 禁止性生活 3 个月
28. 关于脐带脱垂的预防措施，下列描述正确的是
A. 羊水偏少者应采用高位破膜
B. 人工破膜应在宫缩间歇期进行
C. 胎膜已破者应多活动促进产程进展
D. 增加阴道检查次数及早发现脐带脱垂
29. 宫颈癌最常见的病理类型是
A. 菜花型 B. 浸润型
C. 溃疡型 D. 颈管型
30. 关于胎盘、胎膜残留导致晚期产后出血的临床表现，下列描述正确的是
A. 产后血性恶露多且子宫复旧差 B. 子宫下段有压痛
C. 出血多发生于产后 20 余日 D. 常有高热现象

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 在高危妊娠监护中，用于胎儿成熟度检查的方法包括
A. 监测胎动 B. 测量腹围
C. B 型超声检查 D. 测定子宫长度
E. 测定羊水中卵磷脂/鞘磷脂比值

32. 妇科常用化疗药物中，属于抗代谢药的是
A. 甲氨蝶呤 B. 阿糖胞苷
C. 长春新碱 D. 环磷酰胺
E. 5—氟尿嘧啶
33. 在产前诊断中发现下列情况，其中属于遗传代谢疾病的是
A. 脊柱裂 B. 苯丙酮尿症
C. 肝豆状核变性 D. 21-三体综合征
E. 先天卵巢发育不全
34. 应用口服避孕药期间导致阴道流血的原因可能是
A. 雌激素不足 B. 孕激素不足
C. 雌激素过多 D. 孕激素过多
E. 雄激素过多
35. 关于子宫肌瘤患者的护理措施，下列描述正确的是
A. 评估出血量
B. 维持正常血压并纠正贫血
C. 黏膜下肌瘤脱出阴道者应保持局部清洁
D. 随访观察者应每年定期复查并及时纠正治疗方案
E. 选用雄激素治疗者，每月总量应控制在 500mg 以内

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

36. 双合诊
37. 尿瘘
38. 子宫破裂
39. 外阴白色病变
40. 产褥感染

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 简述围绝经期综合征激素替代疗法的定义及适应证。
42. 简述分娩对心脏病孕产妇的主要影响。
43. 简述绒毛膜癌阴道转移患者预防出血的护理措施。
44. 简述妇科肿瘤放射治疗的基本原则。
45. 简述正常分娩后 2 小时内预防产后出血的护理措施。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 某女，30岁，孕34周，因血压升高4天，伴头痛，视物模糊3天入院。既往身体健康，孕20周时血压140/90mmHg。入院后查体：T: 36.5°C, P: 90 次/分, R: 18 次/分, BP: 160/110mmHg, 水肿 (++)，尿蛋白 2.5g/24h，胎心率 155 次/分。入院诊断为子痫前期（重度）。

根据以上资料，请回答：

- (1) 该疾病的主要诊断依据（3分）。
- (2) 该患者采用硫酸镁治疗的注意事项（7分）。

47. 某女，40岁，已婚，G₃P₁，因“经量增多半年”入院。妇科检查：宫颈光滑，子宫前位，增大如孕3个月大小，子宫表面突起，外形不规则，双附件无异常。确诊为子宫肌瘤，拟行腹腔镜下子宫肌瘤剔除术。

根据以上资料，请回答：

- (1) 腹腔镜手术的优点（3分）。
- (2) 该类患者术前的护理措施（7分）。