

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(二) 试题

课程代码:03010

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 关于妇科阴式手术患者术前肠道准备,下列描述正确的是  
A. 术前 3 日流食  
B. 术前 2 日禁食  
C. 术前 1 日清洁灌肠  
D. 术前 3 日口服庆大霉素
- 关于妇科放疗患者出现放射性膀胱炎的处理,下列描述错误的是  
A. 口服维生素 C  
B. 限制患者饮水量  
C. 血尿量多时可用止血剂  
D. 使用尿路抑菌药预防感染
- 羊膜镜检查时观察到羊水的正常颜色是  
A. 黄色  
B. 黄绿色  
C. 淡青色  
D. 深绿色
- 某女, G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>, 单胎妊娠, 手测宫底高度为剑突下 2 横指, 估计该孕妇的孕周是  
A. 24 周末  
B. 28 周末  
C. 32 周末  
D. 36 周末
- 产前诊断中, 下列属于非染色体性先天畸形的疾病是  
A. 脊柱裂  
B. 18-三体综合征  
C. 21-三体综合征  
D. 先天卵巢发育不全症
- 遗传咨询中, 具有垂直传递和终生性特征的是  
A. 遗传性疾病  
B. 先天性疾病  
C. 家族性疾病  
D. 先天缺陷

7. 目前治疗成年女性外阴硬化性苔藓的标准方法是
- A. 氢化可的松软膏局部涂擦                      B. 丙酸睾酮软膏局部涂擦  
C. 肤轻松软膏局部涂擦                          D. 肥皂水清洗
8. 外阴癌最常见的发病部位是
- A. 阴蒂    B. 会阴  
C. 小阴唇    D. 大阴唇
9. 葡萄胎患者最常见的症状是
- A. 子宫异常增大、变软                          B. 停经后阴道流血  
C. 卵巢黄素化囊肿                                D. 腹痛
10. 不孕症患者进行输卵管通畅试验, 时间应选择在月经干净后
- A. 1~3 天    B. 3~7 天  
C. 7~14 天    D. 14 天以后
11. 下列与子宫肌瘤发生和生长最可能相关的因素是
- A. 早婚、早育                                      B. 高血压、肥胖  
C. 雌激素持续性刺激                            D. 不良饮食习惯
12. 下列卵巢肿瘤中属于良性肿瘤的是
- A. 纤维瘤    B. 内胚窦瘤  
C. 未成熟畸胎瘤                                  D. 颗粒细胞瘤
13. 某女, 60岁, 绝经10年后阴道流血。妇科检查: 宫颈表面光滑, 子宫增大、软, 双附件(-)。首先考虑的医疗诊断是
- A. 子宫内膜癌                                      B. 子宫肌瘤  
C. 卵巢癌    D. 宫颈癌
14. 筛查早期宫颈癌的重要方法是
- A. 宫颈活检    B. 宫颈刮片  
C. 分段诊刮    D. 宫颈管涂片
15. 某女, 患有外阴阴道假丝酵母菌病, 护士为其行阴道灌洗时, 应选择的溶液是
- A. 2%~4%碳酸氢钠                              B. 4%硼酸  
C. 5%乳酸    D. 生理盐水
16. 关于产后抑郁症, 下列描述正确的是
- A. 治疗应从基础照顾开始                      B. 70%患者在2年内可治愈  
C. 再次妊娠时复发率可达10%                D. 轻度抑郁患者应服用抗抑郁药



26. 关于协调性宫缩乏力，下列描述正确的是
- A. 子宫收缩极性倒置
  - B. 痉挛性狭窄环紧箍胎体
  - C. 宫缩具有节律性、极性和对称性
  - D. 宫缩的兴奋点来自子宫下段的一处或多处
27. 某女，31岁，葡萄胎第二次清宫术后2个月，阴道不规则流血持续存在，尿HCG(+)。B超显示：子宫肌层可见高回声团，边界清但无包膜。组织学可见绒毛退化痕迹。应首先考虑是
- A. 葡萄胎
  - B. 侵蚀性葡萄胎
  - C. 绒毛膜癌
  - D. 胎盘部位滋养细胞肿瘤
28. 根据尿瘘发生的部位，最多见的是
- A. 尿道阴道瘘
  - B. 膀胱阴道瘘
  - C. 输尿管阴道瘘
  - D. 膀胱尿道阴道瘘
29. 原发性痛经的疼痛部位通常不包括
- A. 大腿内侧
  - B. 下腹部
  - C. 腰骶部
  - D. 脐周
30. 最常见的闭经类型是
- A. 子宫性闭经
  - B. 卵巢性闭经
  - C. 垂体性闭经
  - D. 下丘脑性闭经

二、多项选择题：本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出。错选、多选或少选均无分。

31. 关于子宫内膜异位症，下列描述正确的是
- A. 可导致不孕
  - B. 痛经呈进行性加重
  - C. 多发生在卵巢
  - D. 多合并无排卵性功血
  - E. 血CA<sub>125</sub>水平下降
32. 晚期产后出血中，剖宫产术后子宫伤口裂开的主要原因包括
- A. 术中止血不良
  - B. 过早下地活动
  - C. 切口选择过低
  - D. 切口选择过高
  - E. 缝合技术不当

33. 外阴鳞状上皮增生的主要病理变化包括
- A. 表层萎缩
  - B. 毛囊角质栓塞
  - C. 表皮层角化过度
  - D. 表皮层角化不全
  - E. 棘细胞层不规则增厚
34. 绒毛膜癌脑转移后, 病情分期包括
- A. 瘤前期
  - B. 瘤栓期
  - C. 脑瘤期
  - D. 脑疝期
  - E. 死亡期
35. 下列属于高危儿的是
- A. 早产儿
  - B. 手术产儿
  - C. 足月小样儿
  - D. 小于胎龄儿
  - E. 出生体重 3000g 的新生儿

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

- 36. 阴道镜检查
- 37. 功能失调性子宫出血
- 38. 前置胎盘
- 39. 均小骨盆
- 40. 产前诊断

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

- 41. 简述妇科腹腔镜手术术后腹胀的护理措施。
- 42. 简述放置宫内节育器的并发症。
- 43. 简述人工剥离胎盘术的操作方法。
- 44. 简述妇科肿瘤腔内治疗患者照射后的观察与护理。
- 45. 简述先兆流产的处理原则。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

46. 某女，43 岁，既往月经周期正常，婚后生育一女。近 6 个月发现性生活后阴道流血，妇科检查：宫颈前唇可见直径 2cm 菜花样肿物，触之出血；子宫大小正常，活动度好，无压痛；双附件（-）。宫颈活检结果提示有细胞异型，收入院拟行开腹手术。根据以上资料，请回答：

(1) 该患者最可能的医疗诊断（2 分）。

(2) 该类患者术后康复内容（8 分）。

47. 某女，32 岁，G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>，孕 38 周，妊娠合并糖尿病，一直用胰岛素控制血糖，孕期血糖控制平稳。今晨自然临产入院，检查：宫缩约 3 分钟一次，每次持续 40~50 秒，宫口开大 3cm，先露平棘，胎膜未破，胎心 140 次/分，估计胎儿体重 3200g 左右，左枕前位，无头盆不称，生命体征平稳。

根据以上资料，请回答：

(1) 该产妇适宜的分娩方式（2 分）。

(2) 该类产妇分娩后胰岛素使用的注意事项（3 分）。

(3) 该类产妇所娩出新生儿的处理措施（5 分）。