

2022 年 10 月高等教育自学考试
妇产科护理学(二) 试题
课程代码:03010

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于子宫收缩过强产妇的护理措施,下列描述正确的是
A. 静脉推注硫酸镁
B. 给予灌肠
C. 指导产妇屏气用力
D. 尽量不行会阴侧切术
2. 关于妊娠合并阑尾炎,下列描述正确的是
A. 阑尾炎症状和体征典型,易于诊断
B. 压痛最剧烈的部位可达右肋下肝区
C. 妊娠期急性阑尾炎主张保守治疗
D. 腹痛时可使用热敷以缓解症状
3. 某产妇患有先天性心脏病,现宫内妊娠 38 周已临产,宫口开全,先露棘下 2cm。关于该产妇第二产程的护理措施,下列描述正确的是
A. 鼓励屏气用力,缩短产程
B. 采取仰卧位,便于胎儿娩出
C. 胎儿娩出后立即腹部放置沙袋
D. 每半小时测量心率、呼吸一次
4. 关于习惯性流产,下列描述正确的是
A. 自然流产发生 2 次或以上
B. 早期流产的原因常为染色体异常
C. 晚期流产的原因常为黄体功能不足
D. 每次流产多发生在不同的妊娠月份

5. 母子血型不合会导致新生儿红细胞破坏而引起新生儿
- A. 肺炎
 - B. 溶血
 - C. 硬肿症
 - D. 低血糖
6. 妊娠期高血压疾病使用硫酸镁治疗时，中毒现象首先表现为
- A. 呼吸抑制
 - B. 心跳停止
 - C. 肌张力减退
 - D. 膝反射消失
7. 最常见的功能性卵巢肿瘤是
- A. 畸胎瘤
 - B. 纤维瘤
 - C. 颗粒细胞瘤
 - D. 卵泡膜细胞瘤
8. 下列子宫肌瘤中，最常见的是
- A. 肌壁间肌瘤
 - B. 子宫颈肌瘤
 - C. 黏膜下肌瘤
 - D. 浆膜下肌瘤
9. 关于绒毛膜癌患者的护理措施，下列描述正确的是
- A. 阴道转移破溃出血时填塞纱条需放置 72 小时
 - B. 阴道转移患者需定期行阴道冲洗
 - C. 肺转移患者咯血时应取半卧位
 - D. 患者应节制性生活，做好避孕
10. 大多数侵蚀性葡萄胎发生在葡萄胎清除后
- A. 3 个月内
 - B. 6 个月内
 - C. 1 年后
 - D. 2 年后
11. 外阴白色病变在局部涂药前，一般可先行
- A. 高锰酸钾液冲洗
 - B. 肥皂水擦洗
 - C. 温水坐浴
 - D. 盐水坐浴
12. 关于外阴瘙痒，下列描述正确的是
- A. 假丝酵母菌病和滴虫性阴道炎是最常见原因
 - B. 治疗过程中注意经期卫生，需用肥皂水擦洗
 - C. 急性炎症发作时需用皮质激素软膏涂擦
 - D. 瘙痒仅局限于阴毛部位
13. 下列属于重度放射性膀胱炎症状的是
- A. 突发性血尿
 - B. 尿频、尿急
 - C. 输尿管梗阻
 - D. 膀胱阴道瘘

14. 关于妇科化疗患者出现造血功能障碍，下列描述错误的是
- A. 是化疗副作用中最常见和严重的一种
 - B. 主要表现为白细胞和血小板的减少
 - C. 白细胞常在用药 1 周左右开始下降
 - D. 大多数患者白细胞下降后很难自然恢复
15. 为妇科阴式手术患者进行皮肤准备时，备皮范围上至
- A. 剑突
 - B. 剑突下 2 横指
 - C. 耻骨联合上 10cm
 - D. 脐上 1 横指
16. 关于妇科腹腔镜手术患者的出院指导，下列描述错误的是
- A. 伤口拆线后 1 周可淋浴，平时可用温水擦浴
 - B. 术后 1~2 周阴道可有少量粉红色分泌物
 - C. 行全子宫切除术患者术后 3 个月禁止盆浴
 - D. 行子宫肌瘤剔除术患者术后 2 周禁止性生活
17. 某女，28 岁，平素体健。现妊娠 23 周，因某种原因不能继续妊娠，应采取
- A. 钳刮术
 - B. 利凡诺引产
 - C. 药物流产
 - D. 负压吸引术
18. 关于经腹输卵管结扎术，下列描述正确的是
- A. 术中应保持膀胱充盈
 - B. 术后感染多发生在子宫腔内
 - C. 绝育失败多发生输卵管妊娠
 - D. 术后出血主要由术中止血不严格引起
19. 在进行胎儿宫内监测时，通过羊膜镜主要观察羊水的
- A. 量
 - B. 气味
 - C. 颜色
 - D. 深度
20. 妇女进入围绝经期时，最早出现的临床表现是
- A. 外阴及阴道干燥
 - B. 月经周期改变
 - C. 骨质疏松
 - D. 尿频尿急
21. 黄体功能不足患者月经改变的特点是
- A. 先有停经，继之以大量流血
 - B. 月经周期缩短
 - C. 月经周期正常，但月经期延长
 - D. 闭经

22. 某不孕症患者拟进行输卵管通畅检查, 应选择的时间为
- A. 月经前 3~7 天
B. 月经前 8~14 天
C. 月经干净后 3~7 天
D. 月经干净后 8~14 天
23. 用于判断尿瘘患者瘘孔的位置和大小的辅助检查是
- A. 亚甲蓝试验
B. 靛胭脂试验
C. 碘试验
D. 细胞学试验
24. 下列可以用于监测子宫内膜异位症治疗效果的是
- A. HCG 值
B. CA125 值
C. CA199 值
D. CEA 值
25. 关于诊断性刮宫的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 术后休息 1~2 天
B. 术后绝对卧床 2 小时
C. 术后 4 周内禁止性生活
D. 术后 4 周到门诊复查
26. 关于会阴切开缝合术的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 术后取患侧卧位, 保持外阴清洁
B. 伤口肿胀时可用 25%硫酸镁湿热敷
C. 每日会阴冲洗 2 次, 大便后及时冲洗
D. 如伤口无特殊情况应于术后 7 天拆线
27. 关于会阴湿热敷, 下列描述正确的是
- A. 每 10 分钟更换热敷垫 1 次
B. 热敷时间约为 15~30 分钟
C. 热敷温度一般为 37~40℃
D. 热敷面积应与病损范围一样
28. 关于胎膜早破, 下列描述正确的是
- A. 可导致胎盘早剥
B. 可并发羊膜腔感染
C. 应于破膜 24 小时后给予抗生素
D. 阴道流出液 pH≥6.5 即可诊断
29. 某初产妇, 在分娩过程中出现病理性缩复环, 应首先考虑为
- A. 前置胎盘
B. 胎盘早剥
C. 羊水栓塞
D. 先兆子宫破裂
30. 关于阴道上药的护理要点, 下列描述正确的是
- A. 经期不宜阴道上药
B. 用药期间不影响性生活
C. 阴道栓剂应于清晨上药
D. 无性交史者禁用阴道上药

- 二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出。错选、多选或少选均无分。
31. 关于妇科肿瘤患者化疗用药期间的护理，下列描述正确的有
- A. 保护血管，防止药液外漏
 - B. 药物外渗立即局部热敷促进药物吸收
 - C. 药物外渗 72 小时后可局部冷敷缓解疼痛
 - D. 不同药物要求输入速度不同，要加强巡视、随时调整
 - E. 有条件的情况下应使用输液泵，以保证药物匀速、按时输入
32. 盆腔检查的方法包括
- A. 腹部检查
 - B. 外阴检查
 - C. 双合诊检查
 - D. 直肠-腹部诊
 - E. 阴道窥器检查
33. 子宫内膜癌病理巨检，根据病变的形态和范围包括
- A. 弥散型
 - B. 菜花型
 - C. 溃疡型
 - D. 糜烂型
 - E. 局灶型
34. 羊水过少可导致胎儿出现
- A. 宫内窘迫
 - B. 生长受限
 - C. 肢体短缺
 - D. 神经管畸形
 - E. 肌肉骨骼畸形
35. 关于胎心率基线，下列描述正确的有
- A. 胎心率 > 160 次/分，历时 10 分钟称为心动过速
 - B. 胎心率 < 110 次/分，历时 5 分钟称为心动过缓
 - C. 基线摆动包括胎心率的变异振幅和变异频率
 - D. 基线摆动表示胎儿储备能力丧失
 - E. 基线平直提示胎儿有一定的储备能力

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题:本大题共5小题,每小题3分,共15分。

36. 胎头下降停滞
37. 胎盘早剥
38. 经前期综合征
39. 葡萄胎
40. 产后抑郁症

四、简答题:本大题共5小题,每小题5分,共25分。

41. 简述尿瘘患者的心理护理。
42. 简述口服避孕药物的副反应。
43. 简述妇科腹部手术患者术后血栓并发症的观察与护理。
44. 简述预防产后出血中加强产后观察的护理措施。
45. 简述遗传筛查的手段。

五、论述题:本大题共2小题,每小题10分,共20分。

46. 某女,33岁,宫内妊娠38周,未行规律产前检查。孕妇于1个月前出现轻微头晕、乏力等不适症状,近两天症状加重。查血常规:血红蛋白79g/L,血细胞比容0.3。查体:体温36.3℃,脉搏101次/分,呼吸20次/分,血压110/70mmHg。

根据以上资料,请回答:

- (1) 该患者最可能的医疗诊断。
- (2) 该类患者分娩期的护理措施。

47. 某女,50岁,平素月经规律,无痛经史。近6个月性生活后出现阴道少量流血,近1个月症状加重并伴白带稀薄如水样。妇科查体:宫颈3点处菜花样肿块,触之出血。宫颈和宫颈管活体组织检查均为阳性。

根据以上资料,请回答:

- (1) 该患者最可能的医疗诊断。
- (2) 该类患者术后康复的护理措施。