



7. 男性, 45 岁, 因粘连性肠梗阻入院, 该病人的非手术治疗措施中最重要的是
  - A. 禁食、胃肠减压
  - B. 给予止痛药
  - C. 半卧位
  - D. 给予促进肠蠕动的药物
8. 梗阻性急腹症的腹痛特点是
  - A. 阵发性绞痛
  - B. 持续性隐痛
  - C. 持续性疼痛阵发加剧
  - D. 刀割样疼痛
9. 结肠癌最常见的组织学类型是
  - A. 腺鳞癌
  - B. 腺癌
  - C. 未分化癌
  - D. 类癌
10. 目前治疗肝癌的首选治疗方法是
  - A. 化疗
  - B. 放疗
  - C. 手术
  - D. 肝动脉栓塞
11. 胆道 T 管引流病人胆道远端通畅的表现是
  - A. 腹痛和黄疸减轻, 引流量增多
  - B. 体温正常, 引流量增多
  - C. 黄疸消退, 引流量减少
  - D. 上腹胀痛, 引流量骤减
12. 对诊断胰腺癌敏感性最高的标记物是
  - A. AFP
  - B. CEA
  - C. CA19-9
  - D. POA
13. 通过减少脑血流量降低颅内压的方法是
  - A. 脱水治疗
  - B. 激素治疗
  - C. 过度换气
  - D. 巴比妥治疗
14. 诊断颅底骨折最可靠的临床表现是
  - A. 意识障碍
  - B. 颅底骨质凹陷
  - C. 脑脊液漏
  - D. 局部皮下瘀斑
15. 胸腔镜治疗术后罕见但严重的并发症是
  - A. 心律失常
  - B. 气胸
  - C. 胸膜腔出血
  - D. 气体栓塞
16. 男性, 73 岁, 因肺癌, 吸烟 50 年, 有慢性支气管炎 20 年, 术前特别需要关注的检查是
  - A. 肝功能检查
  - B. 肾功能检查
  - C. 肺功能检查
  - D. 心功能检查
17. 某男性青年, 运动后发生腰部绞痛, 继而出现肉眼血尿, 最可能的诊断是
  - A. 肾癌
  - B. 尿道损伤
  - C. 膀胱癌
  - D. 上尿路结石
18. 前列腺增生病人残余尿测定时, 提示其存在严重梗阻的指标是残余尿量超过
  - A. 20ml
  - B. 50ml
  - C. 100ml
  - D. 150ml
19. 回肠代膀胱病人代膀胱内导管被肠分泌粘液堵塞时, 冲洗液宜用
  - A. 温水
  - B. 碳酸氢钠
  - C. 呋喃西林
  - D. 生理盐水
20. 脊髓损伤病人通过康复训练有可能恢复步行功能, 可将骨盆抬起达到足部跨越楼梯的是
  - A. C<sub>5</sub> 损伤者
  - B. C<sub>7</sub>~T<sub>12</sub> 损伤者
  - C. T<sub>3-12</sub> 损伤者
  - D. L<sub>1-2</sub> 损伤者

二、多项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 关于肺毛细血管楔压（PCWP）的描述，正确的是
- A. 正常值在 5-10mmHg
  - B. 可了解肺静脉压大小
  - C. 估计血容量比 CVP 敏感
  - D. PCWP 低反映血容量不足
  - E. PCWP 高可提示右心房压增高
22. 脓毒症的主要表现有
- A. 起病急，病情重，发展快
  - B. 体温 37~38℃
  - C. 心率加快、脉搏细速，呼吸急促或困难
  - D. 头痛，头晕，恶心，呕吐
  - E. 出现不同程度的代谢性碱中毒
23. 使用漂浮导管可直接测定的指标有
- A. 右心房压力
  - B. 左心房压力
  - C. 肺动脉压力
  - D. 左心室压力
  - E. 心输出量
24. 多器官功能障碍综合征的普遍特征有
- A. 创伤、休克和感染诱发
  - B. 持续高代谢和异常耗能
  - C. 常出现低心输出量和高外周阻力
  - D. 低血糖、低蛋白血症
  - E. 原本健康的器官迅速受累
25. 胃十二指肠溃疡急性大出血的处理措施包括
- A. 禁食
  - B. 平卧位
  - C. 立即手术
  - D. 输液、输血
  - E. 观察呕血、便血情况
26. 急腹症病人诊断不明确时正确的处理方法是
- A. 禁食、禁水
  - B. 积极止痛
  - C. 禁止灌肠
  - D. 胃肠减压
  - E. 禁用泻药
27. 门静脉高压症引起腹水的原因是
- A. 门静脉系的毛细血管床滤过压增加
  - B. 血浆白蛋白降低
  - C. 肝内淋巴回流不畅
  - D. 抗利尿激素增加
  - E. 醛固酮减少
28. 关于颅底骨折的叙述正确的是
- A. 多为凹陷性骨折
  - B. 多属于闭合性骨折
  - C. 常出现脑脊液漏
  - D. 常合并颅神经损伤
  - E. X 线摄片可明确诊断

29. 开放性气胸的处理措施包括
- A. 封闭胸部伤口
  - B. 吸氧
  - C. 补充血容量
  - D. 给予抗生素
  - E. 呼吸机辅助呼吸
30. 肺切除术后常见的并发症是
- A. 出血
  - B. 肺炎
  - C. 肺不张
  - D. 支气管胸膜瘘
  - E. 支气管梗阻

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 三、名词解释（本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分）

- 31. 经腹直肠癌切除术
- 32. 原发性肝癌
- 33. 壶腹周围癌
- 34. 小脑幕切迹疝

### 四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

- 35. 列举烧伤病人补液期间的主要观察指标。
- 36. 列举乳腺癌发病的危险因素。
- 37. 简述 T 管引流导管留置期间的护理要点。
- 38. 简述颅内压增高伴意识障碍病人呼吸道的护理措施。

### 五、病例分析题（本大题共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

39. 男性，27 岁，1 周前无明显诱因出现右上腹胀痛，伴间断恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物。3 天前，疼痛加重，呕吐次数增加，伴少量排气排便。查体：T36.8℃，P84 次/分，R20 次/分，BP90/60mmHg，皮肤粘膜干燥，眼窝凹陷，中等程度腹胀，全腹轻压痛，无固定压痛点，肠鸣音亢进，移动性浊音阴性。腹部 X 线平片可见小肠多个气液平面。被诊断为肠梗阻。患者曾于 2 年前因急性阑尾炎行阑尾切除术。
- 请问：（1）该病人最可能是哪种类型的肠梗阻？原因是什么？
- （2）请列举出该病人的 3 个主要护理诊断/问题。
- （3）病人入院后遵医嘱禁食和胃肠减压，请列出胃肠减压的护理要点。

40. 男性, 57岁, 主因乏力、间断下肢水肿 10 余年, 皮肤、巩膜黄染 10 天, 间断排黑便 5 天, 每天 2~3 次, 1 天前呕血 50ml 入院。查体: 消瘦, 肝病面容, 皮肤重度黄染, 腹饱满, 无腹壁静脉曲张, 肝剑突下 9cm、肋下 7cm 可触及, 质中等, 脾肋下 4cm, 腹部叩诊鼓音, 移动性浊音可疑阳性, 肠鸣音 2 次/分。辅助检查: WBC  $7.12 \times 10^9/L$ , RBC  $1.89 \times 10^{12}/L$ , PLT  $86.00 \times 10^9/L$ 。

问: (1) 病人目前出现了何种问题? 为什么?

(2) 目前应如何处理?