

# 全国 2021 年 10 月高等教育自学考试

## 康复护理学试题

课程代码:04436

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

### 选择题部分

#### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:** 本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 2006 年我国第二次残疾人抽样调查中, 将残疾分为六类, 不包括  
A. 听力残疾                                   B. 内脏残疾  
C. 精神残疾                                   D. 言语残疾
2. 绝对卧床 2 个月后肌容量将减少  
A. 20%   B. 30%  
C. 40%   D. 50%
3. 康复期护理目标不包括  
A. 心理康复                                   B. 职业康复  
C. 残存功能的发挥                           D. 自理观点的建立
4. 拐杖末端着地点与同侧足尖中位的适宜距离为  
A. 10cm                                       B. 15cm  
C. 20cm                                       D. 25cm
5. 能够直接影响患者和家属接受康复治疗态度的是  
A. 家庭关系                                   B. 家庭经济  
C. 家庭文化                                   D. 家庭态度
6. 据 WHO 报告, 脑卒中患者接受康复治疗后 1 年末, ADL 不需要帮助的患者约占  
A. 30%                                       B. 40%  
C. 50%                                       D. 60%

7. 不符合颅脑损伤康复治疗原则的是
- A. 增加肌力，控制肌张力      B. 维持现有的关节活动度  
C. 保持呼吸道通畅      D. 鼓励发挥身体残留能力
8. 对于痉挛型脑瘫患儿在必要时可选择性使用手术治疗，手术包括
- A. 神经手术、肌肉手术、骨关节手术      B. 神经手术、脏器手术、骨关节手术  
C. 肌肉手术、脏器手术、骨关节手术      D. 神经手术、脏器手术、肌肉手术
9. 缺乏伸肘、屈腕能力，手功能丧失，其余上肢功能基本正常；躯干和下肢完全瘫痪；呼吸功能减弱。这类患者脊髓损伤平面最可能是
- A. C<sub>4</sub>完全性脊髓损伤      B. C<sub>5</sub>完全性脊髓损伤  
C. C<sub>6</sub>完全性脊髓损伤      D. C<sub>7</sub>完全性脊髓损伤
10. 除具有周围性面神经麻痹的表现外，常伴有病变同侧外展神经麻痹或其他脑干病损症状和体征的是
- A. 贝尔麻痹      B. 中枢性面神经麻痹  
C. 核性面神经麻痹      D. 亨特综合征
11. 小腿骨折时为了减少患足因重力关系和棉被压迫造成的垂足畸形，应建议患者采取的体位是
- A. 踝关节背伸      B. 踝关节跖伸  
C. 膝关节屈曲      D. 膝关节过伸
12. 护士指导肩周炎患者做体操棒持棒后举练习，应告知患者是为了锻炼患侧肩关节的
- A. 内旋      B. 外展  
C. 外旋      D. 后伸
13. 腰椎间盘突出症损伤常好发于
- A. L<sub>2</sub>~L<sub>3</sub> 或 L<sub>3</sub>~L<sub>4</sub> 椎间盘      B. L<sub>3</sub>~L<sub>4</sub> 或 L<sub>4</sub>~L<sub>5</sub> 椎间盘  
C. L<sub>4</sub>~L<sub>5</sub> 或 L<sub>5</sub>~S<sub>1</sub> 椎间盘      D. L<sub>5</sub>~S<sub>1</sub> 或 S<sub>1</sub>~尾骨椎间盘
14. 护士对腰椎间盘突出症患者做健康教育，要告知其日常生活中常用的正确动作是
- A. 搬重物时弯腰提起      B. 活动时多做腰椎后伸动作  
C. 移动重物时向后拉      D. 进入小汽车时先进腿再坐稳
15. 全膝关节置换术后需要进行关节活动范围的训练，出院时训练目标应达到膝屈曲
- A. 30°      B. 45°  
C. 60°      D. 90°
16. 截肢手术后即刻安装临时假肢，可以限制残肢肿胀，加速残肢定型，减少
- A. 残肢出血      B. 幻肢痛  
C. 残肢水肿      D. 残肢坏死

17. 类风湿关节炎患者仅能生活自理，或从事少数职业活动。其功能评定为  
A. 一级 B. 二级  
C. 三级 D. 四级

18. 手指屈肌腱损伤行肌腱松解术后做肌腱滑动练习，错误的方法是  
A. 只可做被动伸展手指 B. 牵拉肌腱向手指远端滑动  
C. 治疗师的手指放在肌腱粘连处 D. 肌腱滑动力量不超过肌腱连接力量

19. 运动创伤后运动治疗最早开始的时间可以是  
A. 伤后 24 小时出血阶段 B. 伤后 2~7 天炎症反应及肿胀阶段  
C. 伤后 8~21 天局部充血肿胀消退阶段 D. 伤后 3 周拆除固定后阶段

20. 可以应用体位引流帮助排痰的患者是  
A. COPD 急性发作的患者 B. 肺水肿患者  
C. 头颅术后者 D. 食管术后者

21. 屈膝的正常活动范围是  
A. 0°~45° B. 0°~130°  
C. 0°~150° D. 0°~180°

22. 根据 Lovett 肌力分级标准，患者能抗重力做关节全范围运动，但不能抗阻力，则其肌力的级别是  
A. 1 级 B. 2 级  
C. 3 级 D. 4 级

23. 患者男性，28 岁，入院诊断为脑性瘫痪，评估患者 Barthel 指数得分为 30 分，则患者的 ADL 能力缺陷情况为  
A. 极严重功能缺陷 B. 严重功能缺陷  
C. 中度功能缺陷 D. 轻度功能缺陷

24. 在外力辅助下，患者靠主动力量进行运动的类型为  
A. 被动运动 B. 助力运动  
C. 主动运动 D. 抗阻运动

25. 静态姿势的维持主要依靠  
A. 牵张反射 B. 躯体感觉  
C. 前庭功能 D. 平衡反应

26. 按摩疗法中揉法的作用力包括  
A. 压力和振动力 B. 弹力和摩擦力  
C. 压力和弹力 D. 压力和摩擦力

27. 患者，65 岁，其运动时的靶心率一般为  
A. 105 B. 110  
C. 115 D. 120

28. 超声波的治疗作用不包括
- A. 热效应
  - B. 机械效应
  - C. 空化效应
  - D. 电磁效应
29. 磁疗法的禁忌证为
- A. 颈椎病者
  - B. 高血压病者
  - C. 带有心脏起搏器者
  - D. 血管瘤患者
30. 患者发现手术后自己左腿被截肢了，感到非常伤心，但看到旁边患者两条腿都被截肢了，他发现其实还有很多人比他还不幸。该案例中患者的认知治疗策略为
- A. 教育
  - B. 认知重建
  - C. 角色转换
  - D. 向下比较
- 二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
31. 轮椅在康复中的意义体现在
- A. 是移动患者的一种常用工具
  - B. 是不能步行或步行困难者的代步器
  - C. 是残疾人获得职业能力的补助措施
  - D. 是残疾人参加社会交往活动的交通工具
  - E. 是下肢功能障碍者在日常生活活动训练时不可缺少的助具
32. 护士指导骨折患者要保持外固定的稳定性，并告知患者易导致外固定发生改变的原因有
- A. 外固定肢体的活动
  - B. 夹板的松动
  - C. 牵引器具的位置改变
  - D. 牵引力量的改变
  - E. 石膏的松动和移位
33. 肩周炎粘连期理疗的目的有
- A. 改善血液循环
  - B. 缓解肌肉痉挛
  - C. 松弛肌肉
  - D. 松弛韧带
  - E. 恢复关节活动范围
34. 医用紫外线的波长可以是
- A. 480~400nm
  - B. 400~320nm
  - C. 320~280nm
  - D. 280~180nm
  - E. 180~100nm
35. 作业治疗的主要技术方法中的神经生理学方法包括
- A. Rood 法
  - B. Brunnstrom 法
  - C. 本体感觉神经肌肉促进法
  - D. Bobath 法
  - E. 实用性活动

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

**三、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。**

36. 康复医学工作的基本原则是\_\_\_\_\_、功能训练、全面康复、提高生活质量、重返社会。
37. 对于脑卒中急性期患者，护理时应从\_\_\_\_\_处托扶患肢，避免用力牵拉患肢以防造成肩关节软组织的损伤和肩痛。
38. 当患者头部被动前屈时，如下颌不能触及胸骨柄且有阻力时，则提示有\_\_\_\_\_。
39. 目前引起小儿运动伤残的主要疾患是\_\_\_\_\_。
40. 冠状动脉旁路术后患者症状限制性运动试验可在术后第\_\_\_\_\_周进行。
41. 喉癌最常见的表现是\_\_\_\_\_。
42. 患者致残后的心理阶段分期包括无知期、\_\_\_\_\_、否认期、抑郁期、承认期和适应期。
43. 常用的疼痛评估方法有\_\_\_\_\_法、\_\_\_\_\_法和口述分级评分法。
44. 异化运动包括两方面内容，即促进和\_\_\_\_\_。

**四、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。**

45. 自我护理
46. 周围神经损伤
47. 踝关节扭伤
48. 牵引治疗
49. 矫形器

**五、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。**

50. 简述体位转换的意义。
51. 导致骨性关节炎的原因有哪些？
52. 简述肱二头肌的主要功能和检查方法。
53. 患者按照医师制定的运动处方锻炼时应注意什么？

**六、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。**

54. 试述脊髓损伤中后期患者的泌尿系护理措施。
55. 试述颈椎病日常护理措施的主要内容。