

浙江省 2015 年 4 月高等教育自学考试

健康评估试题

课程代码:10292

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列关于会谈的方法和技巧错误的是
A. 会谈环境应该安静舒适和具有私密性
B. 对于唠叨的病人应该直接打断病人的谈话
C. 为了证实或确认病人叙述病史的细节,可用直接提问
D. 会谈中护士应注意非语言的沟通
2. 下列不属于一般资料内容的是
A. 姓名 B. 主诉 C. 年龄 D. 资料来源
3. 关于全身性抽搐,下列说法错误的是
A. 以全身骨骼肌痉挛为主要表现
B. 典型者为癫痫大发作
C. 发作时意识模糊或丧失
D. 瞳孔缩小
4. 下列不符合失血性休克症状的是
A. 脉搏缓慢 B. 出冷汗 C. 面色苍白 D. 口渴
5. 胆汁淤滞性黄疸实验室检查不可能出现的是
A. 血清非结合胆红素大量升高 B. 血清结合胆红素增加
C. 尿胆红素阳性 D. 尿胆原减少

6. 幽门梗阻导致呕吐的典型特点是
- A. 呕吐量小
B. 含有胆汁
C. 喷射性呕吐
D. 呕吐物多为宿食,有酸臭味
7. 当皮下出血为瘀斑时的直径为
- A. $<2\text{mm}$
B. $2\sim 3\text{mm}$
C. $3\sim 5\text{mm}$
D. $>5\text{mm}$
8. 淋巴结质地坚硬,表面光滑,与周围组织粘连,不易推动,多见于
- A. 淋巴结结核
B. 急性扁桃体炎症
C. 慢性鼻炎
D. 恶性肿瘤淋巴结转移
9. Koplik's 斑多见于
- A. 维生素 D 缺乏
B. 猩红热
C. 麻疹
D. 白血病
10. 慢性肺结核患者的胸廓形态多为
- A. 桶状胸
B. 鸡胸
C. 漏斗胸
D. 扁平胸
11. 肺下界上移可见于
- A. 肺炎
B. 肺不张
C. 肺气肿
D. 腹腔脏器下垂
12. 胸骨左缘第 2 肋间触及收缩期震颤提示
- A. 动脉导管未闭
B. 房间隔缺损
C. 肺动脉瓣狭窄
D. 二尖瓣狭窄
13. 下列属于腹壁肿块和腹内肿块鉴别方法的是
- A. 仰卧位抬头时,腹壁肿块更明显
B. 仰卧位抬头时,腹腔内肿块更明显
C. 仰卧位抬头时,腹壁肿块消失
D. 侧卧位时,腹腔内肿块更明显
14. 下列疾病中,浮髌试验是主要诊断依据的是
- A. 关节脱位
B. 关节腔积液
C. 髌骨骨折
D. 骨质增生
15. 右心室肥大时下列哪项是错误的
- A. V1 导联 $R/S \geq 1.0$
B. V1 导联 R 波 $>1.0\text{mV}$
C. aVR 导联 R 波 $>0.5\text{mV}$
D. 心电图轴左偏
16. 房性期前收缩的心电图特征是
- A. 提前出现的 P 波,形态与窦性 P 波略不同
B. 提前发生的 QRS 波群,前无 P 波或无相关 P 波
C. QRS 波宽大畸形,时限 $>0.12\text{s}$;
D. T 波与 QRS 主波方向相反

17. 阵发性室性心动过速的心电图表现是
- A. 连续 3 个或 3 个以上提前出现的 QRS 波群,形态及时限正常
 - B. 连续 3 个或 3 个以上提前出现的 QRS 波群,形态宽大畸形,时限 $>0.12s$
 - C. 心率 160—250 次/分
 - D. 心率 250—350 次/分

18. 下列关于孕妇评估的描述,不正确的方法是
- A. 孕中、晚期的孕妇身体评估时,应采取仰卧位
 - B. 若触摸胎体时,遇到宫缩,则应等待宫缩过后,再进行仔细触摸
 - C. 在与孕妇交谈时应态度温和,措词恰当,避免增加孕妇的紧张情绪
 - D. 孕晚期孕妇体格检查后改变体位时要缓慢,避免体位性低血压的发生

19. 角色期望与角色表现之间差距太大,可以引起
- A. 角色冲突
 - B. 角色模糊
 - C. 角色依赖
 - D. 角色匹配不当

20. 下列不属于家庭内部结构要素的是
- A. 权力结构
 - B. 沟通类型
 - C. 价值观
 - D. 家庭生活周期

二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 大咯血常见的并发症有
- A. 窒息
 - B. 肺不张
 - C. 继发感染
 - D. 失血性休克
 - E. 肝硬化
22. 下列因素可导致瞳孔大小不等的是
- A. 脑外伤
 - B. 脑疝
 - C. 虹膜炎症
 - D. 有机磷农药中毒
 - E. 阿托品中毒
23. 使心尖搏动增强的因素有
- A. 肋间狭窄
 - B. 情绪激动
 - C. 高热
 - D. 甲状腺功能亢进
 - E. 左室肥大
24. 下列关于急性心肌梗死心电图的叙述,正确的是
- A. 早期可出现 T 波高耸
 - B. 急性期可出现异常 Q 波
 - C. 近期缺血性 T 波逐渐恢复正常
 - D. 陈旧期余留 T 波倒置
 - E. 心内膜下心肌梗死不出现异常 Q 波

25. 自我观念紊乱的非语言行为表现包括
- A. 不愿见人
 - B. 不愿照镜子
 - C. 不愿与他人交往
 - D. 不愿看身体意象改变部位
 - E. 不愿与他人讨论伤残或不愿听到相关的评论

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共 14 小题,每空 1 分,共 15 分)

26. 通过询问,系统地收集有关病人双亲及兄弟、姐妹及子女的健康和疾病状况,属于健康史内容中的_____。
27. 现病史主要包括起病情况与患病时间、主要症状的特点、诊断、病情的发展与演变、伴随症状、_____。
28. 每日咯血在_____以内为小量咯血,每日咯血量在_____时为中等量咯血。
29. 胸部触诊的内容主要包括胸廓扩张度、语音震颤和_____。
30. 双踝并拢时双膝分离呈“O”形,称为_____。
31. 在脉搏波形的描记中,_____是心肌受损害的一种表现。
32. 用于判断体型及肝脏测量定位的体表标志是_____。
33. 上腔静脉梗阻时,腹壁曲张静脉的血流方向是_____。
34. 病态窦房结综合征的病人心电图在持续窦性心动过缓、窦性停搏基础上,反复出现快速室上性心律失常,称为_____。
35. 两个正常节律加一个期前收缩连续三次或三次以上出现,被称为_____。
36. 联合国世界卫生组织规定:以实际年龄达到_____岁作为老年的开始。
37. 思维是人脑对客观现实间接、_____的反应。
38. 个人生活在一个陌生的文化环境里所产生的迷惑与失落的经历被称为_____。
39. 当个体的呼气和(或)吸气形态不能使肺充分扩张或排空时可提出_____的护理诊断。

四、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

- 40. 伴随症状
- 41. 黄疸
- 42. 触觉语颤
- 43. 反跳痛
- 44. 肺型 P 波

五、简答题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

45. 简述发热的热型特点及常见疾病。
46. 简述气管向健侧和患侧移位的临床意义。
47. 简述异常心尖搏动的影响因素。
48. 简述心房扑动的心电图表现。
49. 简述认知的概念和组成。

六、综合应用题(本大题 10 分)

50. 患者,男性,20 岁,因吸入花粉后突然出现打喷嚏,随后立即出现胸闷,并迅速出现明显呼吸困难。几天后发作停止,咳嗽咳痰较多稀薄痰液,诊断为支气管哮喘。

请问:该患者通过视、触、叩、听诊等检查有何阳性体征?