

2023 年 10 月高等教育自学考试  
妇产科护理学(一) 试题  
课程代码:03002

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 某女,妊娠合并心脏病,产后 2 小时,腹部压沙袋,其目的是预防
  - A. 羊水栓塞
  - B. 产后出血
  - C. 心力衰竭
  - D. 腹部不适
2. 下列属于先兆临产表现的是
  - A. 见红
  - B. 规律性子宫收缩
  - C. 进行性宫颈口扩张
  - D. 进行性胎先露下降
3. 产褥感染的患者应采取的卧位是
  - A. 平卧位
  - B. 俯卧位
  - C. 侧卧位
  - D. 半坐卧位
4. 滞产的概念是指
  - A. 第一产程超过 16 小时
  - B. 第二产程超过 2 小时
  - C. 第三产程超过 1 小时
  - D. 总产程超过 24 小时
5. 第二产程时娩出胎儿的主要力量是
  - A. 肛提肌收缩力
  - B. 子宫收缩力
  - C. 膈肌收缩力
  - D. 腹肌收缩力

6. 在下丘脑-垂体-卵巢轴的调节过程中,能够分泌雌激素的器官是
- A. 卵巢  
B. 垂体  
C. 下丘脑  
D. 子宫
7. 关于妇科腹部手术术后患者的出院教育,下列描述正确的是
- A. 伤口拆线后即可盆浴  
B. 首次随诊时间为术后3个月  
C. 全子宫切除术患者自手术日起休息6周  
D. 宫外孕手术的患者应禁止性生活3个月
8. 关于妇科肿瘤患者化疗药物外渗的处理,下列描述正确的是
- A. 外渗后立即停药并局部封闭治疗  
B. 外渗1~2天内局部冷敷  
C. 外渗3~4天内局部冷热敷交替进行  
D. 外渗5~6天只行局部热敷即可
9. 关于新生儿呼吸特点,下列描述正确的是
- A. 呼吸肌发育很完善  
B. 呼吸中枢调节功能良好  
C. 以腹式呼吸为主  
D. 频率为每分钟约20次
10. 正常产褥期胎盘附着面的子宫内膜基本完成修复大约需要
- A. 2周  
B. 4周  
C. 6周  
D. 8周
11. 关于阴道镜检查患者的护理要点,下列描述正确的是
- A. 检查前1周禁止性生活  
B. 检查后1个月内禁止盆浴  
C. 检查前24小时内不做妇科检查  
D. 不典型增生上皮涂复方碘液后呈棕褐色
12. 关于避孕药的不良反应及处理,下列描述正确的是
- A. 类早孕反应轻者持续半年后可自行消失,不需处理  
B. 若服药后出现闭经一年,可停药改用其他避孕方法  
C. 月经前半周期出现突破性出血,多因孕激素不足  
D. 长期口服避孕药,可降低卵巢癌发生的风险
13. 胎儿发生宫内窘迫最明显的临床征象是
- A. 胎心率异常  
B. 羊水胎粪污染  
C. 胎动异常活跃  
D. 胎儿酸中毒
14. 普查宫颈癌前期病变和早期宫颈癌,最常用的方法是
- A. 子宫颈刮片细胞学检查  
B. 碘试验  
C. 宫颈管活体组织检查  
D. 阴道镜检查

15. 侵蚀性葡萄胎最主要的转移途径是
- A. 种植转移  
B. 淋巴转移  
C. 血行转移  
D. 直接侵犯
16. 下列炎症中，需要夫妻双方同时治疗的是
- A. 外阴炎  
B. 滴虫性阴道炎  
C. 慢性宫颈炎  
D. 老年性阴道炎
17. 产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过
- A. 200 ml  
B. 300 ml  
C. 400 ml  
D. 500 ml
18. 关于主韧带，下列描述正确的是
- A. 对固定子宫颈位置十分重要  
B. 使宫颈向上、向后牵引，保持子宫前倾位  
C. 子宫两侧向外伸展至骨盆侧壁的翼形腹膜结构  
D. 含有丰富的血管、神经、淋巴管及疏松的结缔组织
19. 关于子宫内膜异位症患者的临床表现，下列描述错误的是
- A. 下腹痛  
B. 不孕  
C. 月经期延长  
D. 月经周期紊乱
20. 目前最常用的剖宫产术式为
- A. 子宫下段纵切口  
B. 子宫下段横切口  
C. 古典型剖宫产术  
D. 腹膜外剖宫产术
21. 下列辅助检查中，有助于前置胎盘诊断与分类的是
- A. B 型超声检查  
B. 血 HCG 检查  
C. 腹腔镜检查  
D. 子宫血管造影检查
22. 关于全子宫切除术术前的阴道准备，下列描述正确的是
- A. 术前 3 日用 1: 40 络合碘冲洗阴道  
B. 术前 3 日晚于宫颈口和穹窿处涂甲紫  
C. 术前 3 日给予甲硝唑泡腾片置于阴道内  
D. 如有阴道出血者，应多次彻底冲洗阴道
23. 功能失调性子宫出血的一线治疗方式是
- A. 手术治疗  
B. 药物治疗  
C. 放疗  
D. 刮宫

24. 参与构成胎盘的蜕膜是

A. 底蜕膜

B. 包蜕膜

C. 真蜕膜

D. 壁蜕膜

25. 一般情况下, 妊娠晚期的子宫呈不同程度的

A. 前倾

B. 后屈

C. 右旋

D. 左旋

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 15 空, 每空 1 分, 共 15 分。

26. 产后若原来胎盘附着面的蜕膜长期残留, 子宫复旧不良, 可发生晚期\_\_\_\_\_。

27. 妊娠合并心脏病妇女的孕期体重增长不宜超过\_\_\_\_\_Kg。

28. 影响分娩的四大因素包括产力、\_\_\_\_\_、胎儿及精神心理因素。

29. 羊水污染分为三度, I 度为\_\_\_\_\_色, 常见于胎儿慢性缺氧。

30. 根据子宫内膜癌的病变形态和范围, 可分为弥漫型和\_\_\_\_\_型。

31. 阴道上皮细胞中的糖原, 在阴道杆菌的作用下可分解为\_\_\_\_\_。

32. 在放置胎头吸引器时, 注意吸引器应避开胎头\_\_\_\_\_门。

33. 骨盆底内层由耻尾肌、髂尾肌及坐尾肌三部分共同组成\_\_\_\_\_肌。

34. 有排卵性功血可分为\_\_\_\_\_和子宫内膜不规则脱落两种。

35. 产后随子宫蜕膜的脱落, 含有血液、坏死蜕膜组织和黏液的阴道排出物称为\_\_\_\_\_。

36. 妊娠期尺测子宫底高度是指从耻骨联合上缘经\_\_\_\_\_至子宫底测得的弧形长度。

37. 吸宫术是应用\_\_\_\_\_的方法将宫腔内妊娠产物吸出, 而达到终止妊娠的目的。

38. 妇科肿瘤化疗中, 最常见和最严重的不良反应是\_\_\_\_\_。

39. 全子宫切除术后 7~14 天内患者阴道有少量粉红色分泌物, 此为\_\_\_\_\_缝线溶化所致。

40. 产程停滞是指宫口持续\_\_\_\_\_小时以上不开大, 先露不下降。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

41. 骨盆轴

42. 胎盘滞留

43. 绝对不孕

44. 继发性闭经

45. 药物流产

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

46. 简述外阴炎患者的护理措施。

47. 简述新生儿居住条件的要求。

48. 简述第二产程护理中接生者的准备内容。

49. 简述羊水的作用。

50. 简述妇科化疗中血小板减少后易发生出血的部位及症状。

五、论述题: 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

51. 某孕妇, 35 岁, 孕 1 产 0, 以“妊娠 29 周, 头痛、眼花、恶心 3 天”入院, 查体: 血压 150/100mmHg, 脉搏 90 次/分, 双下肢水肿 (+), 尿蛋白 (++) , 胎心 134 次/分。初步医疗诊断为“子痫前期”, 医嘱进行硫酸镁治疗。

根据以上资料, 请回答:

(1) 该类孕妇的护理措施;

(2) 使用硫酸镁的注意事项。

52. 某女, 23 岁, 已婚, 停经 86 天, 近 1 周有不规则阴道出血。妇科检查: 子宫底位于脐耻之间, 质软。实验室检查: HCG 阳性。超声提示: 宫腔内未见胎心胎芽, 呈暴风雪样改变。

根据以上资料, 请回答:

(1) 该患者最可能的医疗诊断及主要处理原则;

(2) 该类患者出院宣教的主要内容。